



دليل المزارع للمعاملات الزراعية الجيدة في بساتين الأفوكادو



**دليل المزارع
للمعاملات الزراعية الجيدة
في بساتين الأفوكادو**

دليل المزارع للمعاملات الزراعية الجيدة

في بساتين الأفوكادو

المادة العلمية والصور:

المهندس الزراعي إبراهيم حريري
خبير سلسلة إنتاج الأفوكادو

الإشراف والتدقيق:

المهندس الزراعي حسين حطيط
خبير التنمية الريفية في برنامج التنمية الزراعية والريفية ARDP

التنسيق والمتابعة:

المهندس فاطمة الحلباوي- دائرة الارشاد الزراعي في وزارة الزراعة

مدير فني وتصميم غلاف:

رضوان وزنه

تم إعداد هذا الكتاب ضمن نشاطات
برنامج التنمية الزراعية والريفية ARDP

Budget line ENPI/2010837-021/
Agriculture and Rural Development Programme
Reference: EuropeAid/135358-/M/ACT/LB

This publication has been produced with the support of the European Union.

The contents of this publication are the sole responsibility of the ARDP and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

المقدمة

لما كان تفعيل سلاسل الإنتاج هو أحد محاور إستراتيجية وزارة الزراعة للفترة الممتدة من ٢٠١٥ - ٢٠١٩، والذي يهدف إلى تحسين نوعية الإنتاج ورفع كفاءته، تم تحضير هذا الدليل لمساعدة المهندسين والمرشدين الزراعيين في وزارة الزراعة بالإضافة الى المستثمر والمزارع اللبناني على كيفية زراعة شجرة الأفوكادو والعناية بها.

شجرة الأفوكادو هي شجرة كبيرة الحجم، دائمة الاخضرار ذات أصل شبه استوائي. ثمرة الأفوكادو غنية بالبروتين (amino acids)، والدهون (mono and polyunsaturated)، والعديد من الأملاح والفيتامينات، لذلك هي مصدر غذائي غني ومناسب للأطفال كما هي للبالغين، ولا تحتوي على أي نسبة من الكولسترول.

شهدت زراعة الأفوكادو في لبنان تطورات لافتة في السنوات الأخيرة، بسبب ارتفاع الطلب على هذه الفاكهة في الأسواق المحلية مثل محلات الفاكهة والخضار والمطاعم والفنادق وفي الأسواق الخارجية (التصدير).

تكمن الأهمية الاقتصادية لهذه الثمرة في كونها منتجاً ذات مردود إقتصادي جيد بالنسبة إلى المزارعين، إذ تصل أسعار مبيعه بالجملة إلى حوالى ٨٠٠٠ ليرة لبنانية للكيلوغرام الواحد في آخر شهر تموز للأصناف المتأخرة مثل الهاس. وتتراوح أسعار الكيلوغرام بين ٢٥٠٠ ليرة لبنانية للأصناف الباكرية خلال فترة الإنتاج (ما بين تشرين الأول وكانون الثاني)، وحوالى ٤٠٠٠ ليرة للأصناف المتوسطة بين شهري شباط ونيسان. هذا بالإضافة إلى كونه منتجاً ذو قيمة مضافة عالية يمكن إستخدامه بطرق متعددة، منها:


- الإستهلاك الطازج في سلطة الفاكهة أو سلطة الخضار أو الغواكامولي.
- التصنيع كمادة أولية في الصناعات الغذائية مثل إنتاج الزيت.
- صناعة مواد التجميل

هذه الشجرة منتشرة في المناطق الساحلية اللبنانية حيث تمتد بساتين الأفوكادو على طول الشاطئ اللبناني من الشمال حتى الجنوب، مستفيدة من الظروف المناخية المؤاتية، وخصوصاً في الساحل الجنوبي. إن المناخ اللبناني يتميز عن المناخ في الدول العربية التي تحيط به في إمكانية إنتاج الأفوكادو، وبالتالي لا يوجد منافسة من هذه الدول المجاورة، هذا يعني أن ثمرة الأفوكادو ستكون من المحاصيل ذات القدرة التنافسية العالية في المستقبل، بشرط أن يقوم المزارع اللبناني بزراعة والإعتناء بشجرة الأفوكادو بطريقة مهنية عالية وهذا هو الهدف الاساسي من إعداد هذا الدليل.

الفهرس

٣٤	٢. ١. ٣ المبادئ العامة في التقليم	٥	الفصل الأول: تأسيس البستان
٣٤	٢. ١. ٤ أشكال التربية	٧	١. ١ المتطلبات لزراعة الأفوكادو
٣٧	٢. ٢ الري	٧	١. ١. ١ درجة الحرارة
	٢. ٢. ١ إحتياجات شجرة	٧	١. ١. ٢ التربة
٣٧	الأفوكادو من المياه	٨	١. ١. ٣ الضوء
	٢. ٢. ٢ أنظمة الري الحديثة	٨	١. ١. ٤ الرياح
٣٨	(شبكة الري)	٨	١. ٢ أصناف الأفوكادو
٤٠	٢. ٢. ٣ كفاءة الري	٨	١. ٢. ١ سلالات الأفوكادو
	٢. ٣ العناصر الغذائية	١٠	١. ٢. ٢ أهم أصناف الأفوكادو
٤١	وأعراض النقص	١١	١. ٢. ٢. ١ Lula
٤٣	٢. ٤ التسميد	١٢	٢. ٢. ٢. ٢ Bacon
٤٣	٢. ٤. ١ التسميد الكيميائي	١٣	٣. ٢. ٢. ٢ Zutano
٤٤	٢. ٤. ٢ التسميد العضوي	١٤	٤. ٢. ٢. ٢ Ettinger
٤٤	٢. ٤. ٣ برنامج التسميد	١٥	٥. ٢. ٢. ٢ Fuerte
	الفصل الثالث:	١٦	٦. ٢. ٢. ٢ Ryan Summer Fuerte
٤٧	الإدارة المتكاملة للآفات	١٦	٧. ٢. ٢. ٢ Pinkerton
٤٩	٣. ١ الأمراض الفطرية	١٧	٨. ٢. ٢. ٢ Hass
٤٩	٣. ١. ١ مرض التعفن أو الفايثوفتورا	١٨	٩. ٢. ٢. ٢ Reed
	مرض تعفن الجذور	١٩	١٠. ٢. ٢. ٢ Lamb Hass
٤٩	Phytophthora Root Rot	٢٠	١. ٢. ٣ أهم أصول الأفوكادو
	مرض تقرح جذع الأفوكادو	٢١	١. ٢. ٤ الإزهار والتلقيح
٥١	Trunk Canker Disease	٢٣	١. ٣ زراعة أشجار الأفوكادو
	٣. ١. ٢ مرض		١. ٣. ١ تحضير التربة
٥٢	Anthraco nose	٢٣	في الأراضي الساحلية
٥٣	٣. ١. ٣ مرض جرب ثمرة الأفوكادو		١. ٣. ٢ تحضير التربة
٥٤	٣. ٢ الأكاروز	٢٣	في الأراضي الجبلية
٥٤	٣. ٣ الآفات الحشرية	٢٣	١. ٣. ٣ مسافات الزراعة
٥٤	٣. ٣. ١ الفراشة البيضاء والشحيرة	٢٥	١. ٣. ٤ زرع مصدات رياح
٥٥	٣. ٤ الأمراض الفيروسية	٢٦	١. ٣. ٥ زراعة النصبوب
	٣. ٤. ١ مرض تبقع الشمس الفيروسي المعدي		١. ٣. ٦ الغطاء أو الفرشة
٥٥	Sunblotch Viroid Disease	٢٧	أو الملش (Mulch)
٥٦	٣. ٥ الاضطرابات الفيزيولوجية		الفصل الثاني: العمليات الزراعية
	٣. ٥. ١ توقف نمو الثمار (شكل الخيار)	٣١	السليمة للأفوكادو
٥٦	Cocktails or Cukes	٣٣	٢. ١ التقليم
	الفصل الرابع:	٣٣	٢. ١. ١ أهداف تقليم
٥٧	رزمة العمليات الزراعية السليمة	٣٤	٢. ١. ٢ التوقيت الأنسب للتقليم

الفصل الأول: تأسيس البستان





الفصل الأول: تأسيس البستان

١. ١ المتطلبات لزراعة الأفوكادو

١. ١. ١ درجة الحرارة

تتكيف شجرة الأفوكادو بشكل جيد مع المناخ اللبناني، وهي تزرع للإنتاج التجاري على الساحل اللبناني وحتى إرتفاع ٧٠٠ متر عن سطح البحر، وخاصة في جنوب لبنان. ولكن بما أنها شجرة حساسة للصقيع (frost susceptible) خاصة عند زرعها وفي بداية نموها، لذلك يفضل أن تزرع في أماكن معروفة بعدم تعرضها للصقيع. كما يمكن زراعة أشجار الأفوكادو بصورة تجارية في شمال لبنان، شرط أن يكون ذلك في مواقع يخلو تاريخها من الصقيع (ملاح).

تعتبر درجات الحرارة في لبنان من المتطلبات الأساسية لجعل بستان الأفوكادو منتج ومريح تجارياً. درجة الحرارة المثلى لنمو الأفوكادو هي بين ٢٠ و ٢٨ °مئوية. في بعض الأحيان تتدنى درجات الحرارة بسبب عاصفة ثلجية شديدة البرودة لمدة يومين أو أكثر وتتسبب بصقيع فتتخفض الحرارة على الساحل حتى ٣ درجات. هذا الأمر يؤدي إلى إنعدام الإنتاج إذا حصل أثناء أو قبل فترة الإزهار.

عادة يكون إنتاج الأفوكادو قليل جداً في المناطق التي تكون درجات الحرارة في النهار دون ٢٠ درجة مئوية وفي الليل دون ١٠ درجات خلال فترة الإزهار. فدرجات الحرارة الباردة تحفز شجرة الأفوكادو على النمو الخضري وبالتالي تدني تلقيح الأزهار والإنتاج. من هنا يجب على المزارع في المناطق التي ترتفع أكثر من ٥٠٠ متر عن سطح البحر التأكد من درجات الحرارة في الشتاء قبل إتخاذ قرار زرع شجر الأفوكادو للإنتاج التجاري.

يُنصح بزراعة الأفوكادو في مناطق حيث الطقس دافئ ومتوسط الرطوبة نسبياً أي أن تبقى درجات الحرارة حول الشجرة فوق ١١ درجة مئوية ليلاً وفوق ١٧ درجة نهاراً و الرطوبة ٦٥ ٪ وخاصة في فترة الإزهار لكي لا يتأثر (ينخفض) الإنتاج.

تتحمل أوراق شجرة الأفوكادو صقيع خفيف حسب الصنف (١- إلى ٢- درجة مئوية). ويمكن ان تموت كل الشجرة عندما تنخفض درجة الحرارة إلى -٥ درجو مئوية (حسب الصنف).

١. ١. ٢ التربة

جذور شجرة الأفوكادو سطحية وتتطلب تربة خفيفة لنمو الجذور بشكل صحي وفعل لامتناسص العناصر الغذائية. ينبغي أن تكون خصائص التربة المثالية لزراعة الأفوكادو كالتالي:

- عمق لا يقل عن ١,٥ م
- المسامية العالية.

- لها قدرة على تصريف مياه الأمطار والري.
- خفيفة وغير مرصوصة (قبل الزرع).
- لديها خصوبة معتدلة.
- غنية بالمواد العضوية (على المزارع فحص خصائص التربة خاصة لمعرفة نسبة المواد العضوية.
- التربة الرملية أو الطينية بحاجة إلى زيادة المواد العضوية فيها قبل الزرع).
- على المزارع تجنب زراعة أشجار الأفوكادو في التربة ذات الخصائص التالية:
- تربة ثقيلة مع نسبة عالية من الطين التي تسبب في سرعة تشبّع التربة بالمياه مع صعوبة تصريفها.
- تحتوي على تركيزات عالية من الكلورايد و/أو الصوديوم.

١. ١. ٣ الضوء

تتطلب شجرة الأفوكادو كثافة ضوء عالية. التظليل يعزز النمو الخضري على حساب عقد الثمار، وهذا يعني زيادة طول الفروع مع انخفاض في عدد براعم الزهور، فتتدثر الشجرة بشكل أفقي بسرعة ويكون معظم المحصول على قممها. من هنا تبرز أهمية معرفة شكل نمو كل صنف من الأفوكادو لزراعته بالكثافة المناسبة مع اعتماد تقليم الأشجار سنوياً للسماح بوصول الضوء إلى داخل الشجرة، مما يساهم في تكوين الأزهار على كافة فروعها الداخلية والخارجية.

١. ١. ٤ الرياح

تسبب الرياح الجافة والساخنة أضراراً في أشجار الأفوكادو وأهمها:

١. تساقط الأوراق والأزهار والثمار.
 ٢. إصابة الثمار بالكدمات وتشوها.
 ٣. تكسير الأغصان.
 ٤. إعاقة النحل من تلقيح الأزهار مما يؤدي إلى إنتاج قليل.
- في المناطق التي تتعرض لهبوب رياح مستمر، يفضل زراعة مصدات الرياح على حدود الأرض قبل زراعة نصوب الأفوكادو مثل زراعة شجر السرو أو الكزورينا وتزال عندما تكبر أشجار الأفوكادو، كما يمكن اعتماد مصدات رياح من الشبك.

١. ٢ أصناف الأفوكادو

شتلة الأفوكادو هي عبارة عن جزئين. الأول فوق الأرض وهو الجزء المنتج للثمار أو الصنف والثاني تحت التراب وهو الأصل (البرّي). لإنشاء حقل أفوكادو ناجح ومعمّر، المطلوب من المزارع أن يكون على معرفة بسلالات الصنف ونوعه وأيضا بسلالات الأصل (البرّي) نوعه.

١. ٢. ١ سلالات الأفوكادو

هناك ثلاثة سلالات من الأفوكادو وهي السلالة المكسيكية، السلالة الهندية الغربية و السلالة الغواتيمالية. في الجدول أدناه وصف لخصائص كل سلالة.


جدول ١ : وصف خصائص سلالات الافوكادو

الخصائص / السلالة		السلالة المكسيكية	السلالة الغواتيمالية	السلالة الهندية الغربية
الشجرة	مكان المنشأ	في جبال المكسيك	في جبال غواتيمالا	كولومبيا
	التكيف المناخي	المناطق شبه الإستوائية	المناطق شبه الإستوائية	في المناطق الإستوائية
	تحملًا للبرد	الأكثر من -٤ إلى -٥ °	وسط ٢- درجة مئوية	غير متحمل ١,٥+ درجة مئوية
	تأثرًا بملوحة التربة	كثيرة التأثير	متوسطة التأثير	قلية التأثير
	تحملًا للتربة القلوية	متوسطة التأثير	كثيرة التأثير	قليلة التأثير
	المقاومة	قليل	الأكثر	وسط
	شكل الشجرة	الأطول	الأقصر	وسط
	حجم الورقة	صغيرة الحجم	كبيرة	الأكبر
	لون الورقة	أخضر	أخضر	أخضر فاتح
	لون الطرد	أخضر	أحمر	أخضر فاتح
	رائحة الورقة	يانسون	لا يوجد	لا يوجد
	وجود مادة شمعية تحت الورق	الأكثر	قليل	قليل
الثمرة	الإزهار	باكر	متأخر	باكر وسطي
	عدد الأشهر من الزهرة إلى النضوج	من ٥ إلى ٧ أشهر	من ١٠ إلى ١٨ أشهر	من ٦ إلى ٨ أشهر
	حجم الثمرة	صغيرة إلى متوسطة	صغيرة إلى كبيرة	متوسطة إلى كبيرة
	شكل الثمرة	في الغالب طويلة	في الغالب مدورة	أشكال مختلفة
	لون القشرة الخارجية	عادة الأرجواني	أسود أو أخضر	أخضر شاحب إلى كستنائي
	سماكة سطح القشرة الخارجية	رفيقة جدًا	سميكة	وسط
	لمس سطح القشرة الخارجية stone cells on surface	ناعم (غير موجود)	خشن (موجود)	ليس بوضوح
	التقشير	صعب	بالمجمل سهل	سهل
	نسبة البذر / الثمرة	كبيرة	صغيرة	صغيرة
	محتوى الزيت	الأكثر	وسط	قليل
	قدرة تحمل فترة التخزين في البراد	جيد	جيد	قليل

١. ٢. ٢ أهم أصناف الأفوكادو:

يوجد الآلاف من أصناف الأفوكادو، كل صنف له خصائص ومميزات مختلفة حسب السلالة التي ينتمي إليها. هناك أصناف باكورية و أخرى متأخرة وأصناف ذات إنتاج وفير تنتج سنويا وأخرى إنتاجها قليل أو تميل إلى المعاومة، كما تتنوع أشكال وألوان ثمرة الأفوكادو. فإذا كان الصنف ينتمي إلى السلالة الغواتيمالية نلاحظ الخصائص الغواتيمالية المتمثلة فيه مثل شكل الشجرة، حجم ولون الورقة، لون ورائحة الطرد، عدد الأشهر من الزهرة إلى النضوج، حجم و شكل الثمرة، لون وملمس القشرة الخارجية إلخ... كما أن هناك أصناف هجينة وهي مزيج بين نوعين من نفس السلالة أو مزيج بين نوعين من سلالات مختلفة. صنف الأفوكادو الهجين وهو ناتج عن طفرة (Mutation) أو عن برنامج مخبري (Breeding program) يؤدي إلى ظهور صنف جديد، فتكون مواصفات هذا الصنف الجديد مشتقة من صنفين من نفس السلالة أو من سلالتين مختلفتين فتكون النتيجة إما صنف جديد متطور ذو مزايا جيدة تجعله من الأصناف التجارية أو صنف متواضع أي غير تجاري.

- من المزايا الجيدة لأصناف الأفوكادو الهجينة والتي تجعلها من الأصناف التجارية:
- إنتاج عالي و سنوي (لا يتأثر بالمعاومة).
- قوة وسرعة في النمو مع القدرة على الإنتاج بعد ٣ سنوات من الزرع في الحقل.
- تحمل الصقيع.
- مقاومة بعض الأمراض والحشرات.
- جودة عالية وطعم شهى للثمار مع قدرتها على الحفاظ على جودتها لمدة طويلة بعد القطف.
- نسبة أو حجم اللب أكثر من البذرة.
- وقت القطف.
- سهولة في التوضيب.



صورة ١: أشكال ثمار الأفوكادو



صورة ٢: ألوان ثمار الأفوكادو عند النضوج

معظم أصناف الأفوكادو التجارية هي هجينة. من هم الأصناف التجارية الموجودة في لبنان والعالم

هي:

١. لولا - هجين مكسيكي X غواتيمالي
٢. بايكون - هجين مكسيكي X غواتيمالي
٣. زوتانو - هجين مكسيكي X غواتيمالي
٤. إلتنجر - هجين مكسيكي
٥. فويرتي - هجين مكسيكي X غواتيمالي
٦. ريان - هجين مكسيكي X غواتيمالي
٧. بنكرتون - هجين غواتيمالي
٨. هاس - هجين غواتيمالي ومكسيكي
٩. ريد - هجين غواتيمالي
١٠. لامب هاس - هجين غواتيمالي


يُعتبر نوع الهاس النوع الرئيسي التجاري في العالم، لأنه يتمتع بمذاق جيد وقابلية عالية للإنتاج في ظل مناخات متعددة كما وينمو بشكل جيد جداً في مناطق شبه استوائية مثل جنوب لبنان.

يفضل فقط زراعة الأنواع المعروفة تجارياً، وهي التالية:

وصف وخصائص أصناف الأفوكادو المزروعة في لبنان:


١. لولا Lula

النوع:	هجين مكسيكي - غواتيمالي وهو من الأصناف الباكورية في النضوج
نوع زهره:	الفئة "A"
شكل شجرة:	طويلة ومستقيمة وقوية، سريعة النمو
تحمل البرد:	أكثر الأصناف مقاومة للبرد
الإنتاج:	غزيرة ومنتظمة في الإنتاج
موسم القطف:	باكوري (أيلول - تشرين أول\ تشرين ثاني) وهو من الأصناف الباكورية
شكل الثمرة:	مثل الإجاص مع الرقبة
وزن الثمرة:	٤٥٠ - ٦٠٠ غرام
القشرة الخارجية:	ناعمة ولونها أخضر داكن ولامع معاً
اللحم الداخلي:	أصفر مائل إلى خضار
نسبة الزيت:	١٦-١٢٪
النكهة:	جيدة
البذرة:	كبيرة وضيقة في جوف الثمرة وأحياناً تستعمل لإنتاج أصل (بري).
أمراض:	عرضة كثيراً للجرب
طلب السوق:	تباع بأسعار جيدة وخاصة قبل قطف الأتاجر.



٢. بايكون / Bacon

النوع:	هجين مكسيكي - غواتيمالي وهو من الأصناف الباكورية في النضوج
نوع زهره:	الفئة "B" وهو يزهر لتلقيح الأصناف المتأخرة الإنتاج
شكل شجرة:	مستقيمة النمو
تحمل البرد:	يتحمل صقيع حتى -٤ درجة مئوية ، هذا النوع هو خيار جيد للمرتفعات (٦٠٠م)
الإنتاج:	غزيرة ومنظمة في الإنتاج
موسم القطف:	من تشرين إلي كانون أول وهو من الأصناف الباكورية
شكل الثمرة:	بيضوية الشكل.
وزن الثمرة:	٢٠٠-٣٥٠ غرام.
القشرة الخارجية:	رفيقة وناعمة ولونها أخضر
اللحم الداخلي:	شاحب الأصفر والأخضر.
نسبة الزيت:	١٧٪
النكهة:	جيدة
البذرة:	كبيرة
أمراض:	يتأثر هذا الصنف بعفن الطرف، وهو عيب وراثي يظهر على القشرة الخارجية في كعب الثمرة، خاصة عندما تتوفر له بعض الظروف البيئية تحديدا تلوث الهواء أو الأماكن التي يكثر فيها الدخان والضباب.
طلب السوق:	تباع بأسعار أقل من الأتاجر.




٣. زوتانو / Zutano

النوع:	مكسيكي ولكن بعض المراجع تقول أنه هجين مكسيكي - غواتيمالي وهو من الأصناف الباكورية في النضوج
نوع زهره:	الفئة "B" و هو يزرع لتلقيح الأصناف المتأخرة الإنتاج
شكل شجرة:	مستقيمة وقوية النمو
تحمل البرد:	يتحمل صقيع حتى -٤ درجة مئوية
الإنتاج:	غزيرة ومنظمة في الإنتاج
موسم القطف:	في كانون الاول والثاني و هو من الأصناف الباكورية
شكل الثمرة:	بيضوي إلي كمثري
وزن الثمرة:	٢٥٠-٤٠٠ غرام
القشرة الخارجية:	رقيقة جدا وجلدية الملمس ولونها أخضر
الللب الداخلي:	بنية اللب مائية ذات لون أبيض اللون مائل إلى صفار
نسبة الزيت:	١٥٪
النكهة:	نكهة عادية
البذرة:	متوسطة إلى كبيرة الحجم ومخرطية الشكل وتستخدم لإنتاج الأصل البري ولكن يكون غير مقاوم لمرض عفن الجذور (فايتوفتورا).
أمراض:	يتأثر هذا الصنف بعفن الطرف ، وهو عيب وراثي يظهر على القشرة الخارجية في كعب الثمرة خاصة عندما تتوفر له بعض الظروف البيئية تحديدا تلوث الهواء أو الأماكن التي يكثر فيها الدخان والضباب. - حساس للانتراكناز
طلب السوق:	أسعاره أقل من الأتاجر والفويرتي.

النوع:	مكسيكي وهو من الأصناف الباكورية في النضوج
نوع زهره:	الفئة "B" وهو يزرع لتلقيح الأصناف المتأخرة الإنتاج مثل الامب هاس والريد.
شكل شجرة:	قوية النمو، عامودية / مستقيمة وتتدلى منها الفروع الجانبية
تحمل البرد:	يتحمل الصقيع أكثر من صنف الفويرتي وحتى -٣ درجة مئوية
الإنتاج:	متوسط إلى غزير في الإنتاج ولكنه منتظم في الإنتاج
موسم القطف:	ينضج في وقت مبكر وبشكل موحد، قبل حوالي شهر من فويرتي أي في تشرين الأول ويستمر على الشجرة لشهر كانون الأول عندها يبدأ بالتساقط.
الثمرة:	شكلها بيضاوي ضيق. لا يمكن إبقائها على الشجرة لمدة طويلة ولكنها تبقى بحالة جيدة لمدة طويلة بعد القطف.
وزن الثمرة:	١٧٠-٥٧٠ غرام
القشرة الخارجية:	لونها أخضر وسطحها خشن قليلا
الللب الداخلي:	ناعم ويذوب في الفم، خالي من الألياف أما اللون فهو كريم مائل إلى صفار.
نسبة الزيت:	١٥٪
النكهة:	نوعية ممتازة
البذرة:	بذرة كبيرة، فضفاضة في جوف الثمرة وغلاف البذرة ملتصقة بالللب
أمراض:	- يتأثر هذا الصنف بعفن الطرف، وهو عيب وراثي يظهر على القشرة الخارجية في كعب الثمرة خاصة عندما تتوفر له بعض الظروف البيئية تحديدا تلوث الهواء أو الأماكن التي يكثر فيها الدخان والضباب. - الانتراكنوز - تشقق القشرة
أمراض:	- يتأثر هذا الصنف بعفن الطرف (end spotting & corking)، وهو عيب وراثي يظهر على القشرة الخارجية في كعب الثمرة خاصة عندما تتوفر له بعض الظروف البيئية تحديدا تلوث الهواء أو الأماكن التي يكثر فيها الدخان والضباب. - عرضة لتعفن في عنق الثمرة بعد القطف. - عرضة لتشقق في قشرة الثمرة الخارجية من الأسفل عند النضوج. - عرضة لحشرة تبقع الافوكادو الضرر الناتجة عن حشرة تبقع الافوكادو - يتأثر بمرض الانتراكنوز
طلب السوق لها:	صنف تجاري مميز ويستخدم للأسواق المحلية والتصدير.





٥. فويرتي / Fuerte


النوع:	هجين مكسيكي - غواتيمالي وهناك افتراض وجود عدة سلالات مختلفة من الفويرتي نتيجة الطفرة (mutation)
نوع زهره:	الفئة "B" وهو يزرع لتلقيح الأصناف المتأخرة الإنتاج مثل الهاس
شكل شجرة:	قوية النمو، شجرة واسعة وتنتشر منها الفروع الجانبية، وليس لها فرع رئيسي ملك
تحمل البرد:	يتحمل صقيع حتى -٢,٨ درجة مئوية
الإنتاج:	تتأثر بالمعاومة (موسم غزيرة الإنتاج، يليه موسم قليل الإنتاج)
موسم القطف:	ينضج في كانون الأول ويستمر على الشجرة حتى شهر آذار، ويمكن إبقائها على الشجرة لمدة طويلة ولكن حياتها قصيرة بعد القطف
الثمرة:	شكلها مثل الإجاصة
وزن الثمرة:	٢٥٠ - ٤٥٠ غرام
القشرة الخارجية:	خشنة قليلا مع العديد من النقاط الصفراء الصغيرة، رقيقة وخضراء.
الللب الداخلي:	ناعم ويذوب في الفم، خالي من الألياف أما اللون فهو كريم مائل إلى صفار
نسبة الزيت:	١٨٪
النكهة:	نكهة مميزة يشبه المكسرات
البذرة:	متوسطة إلى كبيرة الحجم
أمراض:	- الانتراكنوز - الجرب على الثمر - عرضة لتعفن في عنق الثمرة بعد القطف - عرضة للحشرات في المناطق ذات الرطوبة العالية - تتحمل الاكاروز
طلب السوق لها:	صنف تجاري مميز ويستخدم للأسواق المحلية والتصدير.

٦. ريان / Ryan (Summer Fuerte)

النوع:	هجين مكسيكي - غواتيمالي وهو من الأصناف المتأخرة في النضوج
نوع زهره:	الفئة "B"
شكل شجرة:	شجرة قوية مع شكل دائري ومتوسطة إلى كبيرة الحجم
تحمل البرد:	يتحمل صقيع حتى -١,٦ درجة مئوية
الإنتاج:	إنتاجها خفيف جدا في البرد و يكون وفيرا وسنوياً في المناطق الدافئة
موسم القطف:	ينضج من شهر أيار ويمكن إبقاء الثمار على الشجرة إلى أيلول ولكن حياتها قصيرة بعد القطف
الثمرة:	شكلها مثل الإجاصة
وزن الثمرة:	٢٢٥ - ٤٠٠ غرام
القشرة الخارجية:	لونها أخضر، متوسطة السماكة، جلدية الملمس وخشنة قليلاً
الللب الداخلي:	لون أصفر مائل إلى الذهبي
نسبة الزيت:	٢٥٪
النكهة:	نكهة عادية
البذرة:	كبيرة الحجم
أمراض أو مشاكل:	- غير متجانس بالنضوج. - تصاب الثمار بالكدمات بسهولة
طلب السوق لها:	غير مطلوب في الاسواق


٧. بنكرتون / Pinkerton

النوع:	هجين غواتيمالي وهو من الأصناف المتوسطة في النضوج	نوع زهره:	الفئة "A"
شكل شجرة:	تنمو عادةً على شكل مظلة منخفضة		
تحمل البرد:	تتحمل الصقيع بشكل متوسط، ليس أقل من -٢ درجة مئوية	الإنتاج:	إنتاجها وفيراً وسنوياً
موسم القطف:	تنضج الثمار في شهر كانون الثاني ويمكن إبقائها على الشجرة حتى أواخر نيسان. حياتها طويلة بعد القطف.		
الثمرة:	شكلها مثل الإجاصة مع رقبة طويلة ومعكوفة قليلاً.	وزن الثمرة:	٢٣٠ - ٢٥٠ غرام
القشرة الخارجية:	لونها أخضر داكن ويميل إلى التعتيم في الجزء الأخير من الموسم، متوسطة السماكة، جلدية الملمس، خشنة ولها نتوءات بارزة كأنها مرصوفة بالحصى، كما أنها سهلة التقشير.		
الللب الداخلي:	لون كريم مائل إلى صفار مثل الزبدة وخالي من الألياف.		
نسبة الزيت:	٢٥٪		
النكهة:	نكهة مميزة يشبه المكسرات		
البذرة:	صغيرة الحجم		
أمراض أو مشاكل:	- غير متجانس بالنضوج. - مقاوم للأنثراكنوز		
طلب السوق لها:	صنف تجاري ممتاز ولكن رقيتها هي العيب الوحيد عند التصدير.		



٨. هاس / Hass

النوع:	هجين غواتيمالي مع بعض الجينات المكسيكية. من الأصناف المتأخرة حيث ينضج في الصيف.
نوع زهره:	الفئة "A"
شكل شجرة:	شجرة قوية مستقيمة ومنتشرة في النمو
تحمل البرد:	يتحمل صقيع حتى -١,٦ درجة مئوية
الإنتاج:	إنتاجها جيد، ولكن الأشجار الفردية هي قليلة الإنتاج وتميل للمعاومة.
موسم القطف:	تنضج الثمار من شهر كانون الثاني ويمكن إبقائها على الشجرة حتى تموز وتحافظ على جودتها المتأخرة لمدة طويلة قبل وبعد القطف، ولكن إذا تم ترك الثمار على الشجرة لوقت متأخر يمكن أن يقل إنتاجها في المواسم المقبلة وتنتج إلى المعاومة.
الثمرة:	شكلها مثل الإحاصه وبيضوية (من دون رقبة)، متوسطة الحجم ولديها ميل لتكون صغيرة (الأصغر بين ثمار الأفوكادو).
وزن الثمرة:	١٥٠ - ٣٠٠ غرام، يقل وزن الثمار عندما تضعف أو تدهور الحالة الصحية للشجرة وعندما تكبر الشجرة بالعمر.
القشرة الخرجية:	لونها أخضر داكن وعندما تنضج يتحول لون القشرة إلى بنفسجي أو أسود تقريباً، سمكية، جلدية وخشنة الملمس ولها نتوءات بارزة كأنها مرصوفة بالحصى، كما أنها سهلة التقشير.
اللُب الداخلي:	ناعم ويذوب في الفم، اللون كريم مائل إلى صفار مثل الزبدة وخالي من الألياف
نسبة الزيت:	١٨-٢٣ %
النكهة:	نكهة ممتازة ودسمة تشبه المكسرات
البذرة:	بذرة صغيرة الحجم وضيقة في جوف الثمرة
أمراض أو مشاكل:	- تتأثر الأوراق بالأكاروز - الشجرة بطيئة في إنتاج غطاء ورقي جديد في فصل الربيع مما يجعل بعض الأغصان و الثمار عرضة للحرق من الشمس.
طلب السوق لها:	هو الصنف الرائدة في التجارة والتصدير، ممتاز للشحن ومطلوب إلى معظم أسواق الفاكهة العالمية.



٩. ريـد / Reed

النوع:	غواتيمالي وهو من الأصناف المتأخرة حيث ينضج في الصيف.
نوع زهره:	الفئة "A"
شكل شجرة:	شجرة مستقيمة في النمو ومنصبه و دائرية معا ، الأغصان متدلية تحمي الثمار من الشمس.
تحمل البرد:	تتحمل الصقيع بشكل قليل ، ليس أقل من ١- درجة مئوية
الإنتاج:	إنتاجها عالي ومنتظم
موسم القطاف:	تنضج الثمار من شهر نيسان ويمكن إبقائها على الشجرة حتى تموز لكي تباع بأسعار جيدة. تبقى ذو جودة ممتازة لمدة طويلة قبل وبعد القطاف .
الثمرة:	شكلها كروي
وزن الثمرة:	٣٠٠ - ٦٨٠ غرام
القشرة الخارجية:	لونها أخضر داكن عندما تنضج ، سميكة ، جلدية وخشنة اللمس وسهلة التقشير
اللـب الداخلي:	لون كريم مائل إلى صفار مثل الزبدة وخالي من الألياف
نسبة الزيت:	١٨ ٪
نكهة:	ممتازة ودسمة على نكهة الزبدة والمكسرات
البذرة:	البذرة متوسطة الى كبيرة الحجم ، وضيقة في جوف الثمرة ، قشرة البذرة دائما ملاصقة بها .
أمراض أو مشاكل:	- لا تتأثر الأوراق بالأكاروز
طلب السوق لها:	صنف ممتاز للشحن ويمكن تخزينه لمدة شهر واحد أكثر من هاس

١٠. لامب هاس / Lamb Hass

النوع:	هجين وهو من الأصناف المتأخرة حيث ينضج في الصيف.
نوع زهره:	الفئة "A"
شكل شجرة:	شجرة مستقيمة في النمو
تحمل البرد:	تتحمل الصقيع أقل من الهاس
الإنتاج:	إنتاجها عالي ومنتظم
موسم القطف:	تنضج الثمار من شهر أيار ويمكن إبقائها على الشجرة حتى تموز وأب.
الثمرة:	أكبر من الهاس وشكلها مثل الإجاصة ولكنها تتميز برقبة عريضة وقصيرة.
وزن الثمرة:	٢٣٥ - ٤٥٠ غرام
القشرة الخرجية:	لونها يتحول إلى الأسود عند النضج، سميكة ولكنها هشة، خشنة الملمس ولها نتوءات بارزة كأنها مرصوفة بالحصى، كما أنها سهلة التقشير
اللبن الداخلي:	لون مائل إلى صفار
نسبة الزيت:	١٨ %
النكهة:	ممتازة ودسمة
البذرة:	البذرة متوسطة الحجم ودائرية.
أمراض أو مشاكل:	الأوراق أكثر مقاومةً للاكاروز نسبةً للهاس
طلب السوق لها:	ليست أفضل من الهاس

جدول رقم ٢: رزنامة قطف أصناف الأفوكادو المزروعة في لبنان

ج	الصنف	١	٢	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠	١١	١٢
لولا													
بيكون													
زوتانو													
أتنجر													
فويرتي													
ريان													
بنكرتون													
هاس													
لامب هاس													
ريد													

١. ٢. ٣ أهم أصول الأفوكادو

يبدأ إنتاج شتلة الأفوكادو من البذرة، والتي ينبغي أن تكون من صنف صالح للاستعمال كأصل. بعد زراعة البذرة تنمو شتلة الأفوكادو وهذه المرحلة هي مرحلة تربية الأصل حتى يصبح جاهز للتطعيم. عندما يُطعم الصنف التجاري على الأصل تبدأ مرحلة تربية الصنف (المطعم).

يتم اختيار نوع الأصل (البري) لشتلة الأفوكادو حسب المكان الجغرافي حيث سيتم إنشاء البستان. ففي الأماكن المتوسطة ذات الشتاء البارد والمطر والصيف المعتدل الجاف كحال لبنان من المفضل أن يُطعم الأفوكادو على أصول تتحمل البرد وتربة ومياه ري قلوية. كما ينبغي أن يكون الأصل من الأصناف الغزيرة الإنتاج والتي تثمر سنويا وذلك كي لا تؤثر سلبا على إنتاجية الصنف المطعم عليه. هذه المواصفات متوفرة في بعض الأصناف ذات الأصل المكسيكي والتي يمكن أن تستخدم لإنتاج الأصول. وتشمل هذه الأصناف: توبا توبا والمكسيكولا

توبا توبا (Topa Topa): من العرق المكسيكي، يتحمل البرد، ليس مقاوما لمرض الفايوتفورا ولا يتحمل الملوحة. شجرة هذا الصنف قوية النمو وغزيرة الإنتاج، وتتميز الشتول بالقوة والتجانس بالنمو وسهولة التطعيم. هذا الصنف متوفر في المشاتل اللبنانية وأيضا مستورد من إسبانيا.

مكسيكولا (Mexicola): من العرق المكسيكي وموفر في لبنان، متحمل للبرد وليس مقاوم لمرض الفايوتفورا ولا يتحمل الملوحة نهائيا، كما أن الشتول سهلة التطعيم. إنتاج صنف الفويرتي/مكسيكولا أكثر من الفويرتي/توبا توبا.

هناك أصناف هجينة تستخدم أيضا لإنتاج الأصول. وتشمل هذه الأصناف:

زوتانو (Zutano): هو هجين مكسيكي X غواتيمالي. له قدرة على تحمل الملوحة والصقيع، ليس مقاوم لمرض الفايوتفورا.

لولا (Lula): هو هجين غواتيمالي X مكسيكي. هذا الصنف هو من أكثر الأصناف تحمل للبرد، قوي وسريع النمو، وغزير الإنتاج، ولكن ليس مقاوم لمرض الفايوتفورا. هذا الصنف متوفر في المشاتل اللبنانية.

ومن الأصناف الهجينة المستنسخة (clonal) أصول الديوك ٧ والدوزا والمرينسكي وهي تنتمي إلى العرق المكسيكي وتمتاز بقوة النمو وغزارة الإنتاج، خاصة في المناطق الباردة وفي التربة القلوية. كما أنها تتحمل مرض الفايوتفورا بعكس الأصناف المكسيكية الأخرى لذلك تعتمد في الأراضي التي كانت سابقا مزروعة أفوكادو أو في الأراضي الطينية الثقيلة المعرضة للأصابة بهذا المرض. هذه الأصناف غير متوفرة في المشاتل اللبنانية بل تستورد من الخارج بسعر ضعيف الغراس العادية، لذلك ليس من الضروري استعمال هذه الأصول في الأراضي الخفيفة ذات تصريف عالي للمياه والخالية من مرض الفايوتفورا (عادة ما تكون الأراضي التي تزرع لأول مرة أفوكادو خالية من هذا المرض).

ديوك (Duke): صنف مكسيكي الأصل ومتحمل أيضا للمناخ البارد. هناك صنفان ديوك ٦ وديوك ٧. الأول قليل الاستخدام لأن شتلته بطيئة النمو، وخاصة في التربة القلوية. أما الديوك ٧ فهي سريعة النمو، متوسطة التحمل لمرض التعفن ويفضل زراعتها في الأراضي الخفيفة. المطاعيم على الديوك ٧ لها أدنى نسبة معاومة. يزيد إنتاج صنف الهاس/الديوك ٧ عن صنف الهاس/توبا توبا.

اتاس أو مرينسكي ١ (Merensky 1): هو صنف مكسيكي مقاوم لمرض التعفن. يزيد إنتاج صنف الهاس/مرينسكي ١ عن إنتاج الهاس/الديوك ٧.

دوزا أو مرينسكي ٢ (Merensky 2): هو صنف مكسيكي مقاوم لمرض التعفن. يزيد إنتاج صنف الهاس/مرينسكي ٢ أكثر ٣٠٪ من إنتاج الهاس/الديوك ٧. مرينسكي ٢ مقاوم لمرض التعفن أكثر من مرينسكي ١ والديوك ٧. هناك أصول أخرى لشجرة الأفوكادو من العرق الهندي الغربي والعرق الغواتيمالي أو هجين بينهما ولكنها لا تزرع في لبنان لعدم ملائمتها البرد والتربة القلوية.

لإنشاء بستان أفوكادو تجاري متجانس وناجح ينصح بزراعة صنف موحد مع أصل موحد في قسم واحد. تجنب خلط أصناف الشتول والأصول في القسم الواحد وذلك لتسهيل عمليات الإعتناء والري والتسميد بحيث يتم إدارة كل قسم بشكل مستقل. على المزارع أن يحرص دائما على شراء شتول من مصدر موثوق يكفل نوع الصنف والأصل وذلك لتفادي الاختلاف في نمو شجرة الأفوكادو وإنتاجها.

تساهم درجة حرارة الهواء في عملية فتح وإغلاق أزهار الأفوكادو والتي تستمر عادةً على مدى يومين متتاليين. في نفس الوقت، تكون كل الأزهار المفتوحة على شجرة الأفوكادو إما ذكور أو إناث، إذا كانت درجة الحرارة مستقرة. ولكن في فصل الربيع، تعمل التغيرات السريعة في درجات الحرارة على تعطيل نمط الإزهار وتسبب بعض التداخل بين مراحل الذكور والإناث خلال الجزء الأوسط من اليوم. هذا التداخل يتيح التلقيح الذاتي. فإذا كانت درجات الحرارة باردة باستمرار، تفتح الزهور مرة واحدة لفترة طويلة على شكل ذكور وبالتالي لن يحدث تلقيح ذاتي.

إن أصناف الأفوكادو ذات نمط التزهير B هي أكثر حساسية لدرجات الحرارة الباردة. وهذا يعني فترات أطول للزهر على شكل ذكور، وبالتالي تقليل من فرص التلقيح وعقد الثمار. على سبيل المثال، تتعطل دورات الإزهار في أصناف الأفوكادو ذات نمط التزهير B عندما تكون درجات الحرارة خلال فترة الإزهار أقل من ٢٠ درجة مئوية في النهار و ١٥ درجة مئوية في الليل. أما أصناف الأفوكادو ذات نمط التزهير A فلا تتأثر دورات الإزهار عند انخفاض درجات الحرارة في الليل والنهار خلال فترة الإزهار. من الناحية الفنية، في المناطق حيث درجات الحرارة خلال فترة الإزهار هي دائماً أقل من ٢٠ درجة مئوية في النهار و ١٥ درجة مئوية في الليل، فإن زرع خليط من أصناف الأفوكادو ذات نمط التزهير B و A داخل نفس القسم من البستان تكون مفيدة في تحسين التلقيح ولكن من الناحية الاقتصادية قد لا يكون هناك فائدة تجارية كافية لتبرير هذه الممارسة نظراً إلى الصعوبات الإضافية في إدارة الأقسام ذات الأصناف المختلطة. عندما تتعرض الزهور من الذكور والإناث إلى درجات الحرارة أقل من ١٠ درجة مئوية في الليل لمدة ثلاثة أيام يتأثر التلقيح حتى بوجود صنف ملقح، وخاصة للأصناف من نوع B مثل الفويرتي فيؤدي إلى إنتاج فاكهة بنوعية منخفضة على شكل خيار صغير (أنظر الإضطرابات الفيزيولوجية).



صورة ٤: ثمار على شكل خيار صغير

دور النحل في تلقيح الأفوكادو

من الممكن الحصول على إنتاج وفير من مختلف أصناف الأفوكادو (الأصناف التي تنتج سنوياً) بدون الحاجة إلى التلقيح المعاكس ويعود هذا بالفائدة من الناحية التجارية، حتى لا يختلط نوع ثمرة الملقح (ذات السعر المتدني) مع النوع التجاري (ذات السعر العالي)، وذلك باللجوء إلى النحل. يقوم النحل بتلقيح الأفوكادو ولكن لسوء الحظ، فإن النحل قليل الانجذاب لزهرة الأفوكادو. من أجل تفعيل عملية التلقيح، يتم اللجوء إلى تكثيف خلايا النحل في ذروة الإزهار بمعدل خلية واحدة لكل ثلاثة دونمات أفوكادو، ويفضل توزيع الخلايا في الحقل مع إزالة كل النباتات أو تجنب زراعة الأشجار التي تزهر في نفس الوقت مع الأفوكادو حتى لا يشتت ذلك إنتباه النحل عن أزهار الأفوكادو.

١.٣ زراعة أشجار الأفوكادو

١.٣.١ تحضير التربة في الأراضي الساحلية:

- إنشاء خنادق لتصريف المياه.
- فلش التراب الفائض (من حفر الخنادق) في الأماكن المنخفضة لتسوية الأرض جيداً لمنع تكون المستنقعات بسبب مياه الأمطار وخاصة في الأراضي الطينية.
- نقيب الأرض على جرافة جنزير على عمق متر إذا كان عمق التربة يسمح بذلك. عند النقب تظهر بعض الصخور والحجارة لذلك يتم جمعها ونقلها خارج البستان.
- حراثة التربة بالطول والعرض لتكسير وتهشيم الكتل الترابية الناتجة عن النقب. يستعمل في هذه المرحلة سكة كبيرة.
- فرم الأرض لتنعيم التربة.

١.٣.٢ تحضير التربة في الأراضي الجبلية:

- المقصود في الأراضي الجبلية هي سفوح الجبال التي يمكن أن تُستثمر في زراعة الأفوكادو وهي في العادة لا يتجاوز ارتفاعها عن سطح البحر الـ ٧٠٠ متر. تتم هذه العملية كالتالي:
- شق جلول في الجبل بواسطة جرافة جنزير كبيرة مع الأخذ بعين الاعتبار حركة الشمس للسماح بوصول الضوء قدر المستطاع إلى كامل الجبل المراد إنشاؤه وبالتالي إلى داخل الأشجار التي ستزرع.
- عندما تشق الجلول وتتوضح حدود كل جل، تحدد مسافات الزرع حسب الصنف المراد زرع.
- إذا كانت سماكة التراب غير متوفرة يتم اللجوء إلى حفر حفرة لكل غرسة بعمق ١,٥ متر وعرض ١ متر (حفرة بحجم ١,٥ متر مكعب) ومن ثم يعمل المزارع إلى نقل الردم الناتج عن الحفر إلى جلول أخرى لتوسيعها أو إلى خارج البستان.
- ملئ الحفر بتراب زراعي جيد (تراب أحمر).

١.٣.٣ مسافات الزراعة

تختلف المسافات المعتمدة بين أشجار الأفوكادو باختلاف صنف وأصل الشتول وظروف الزراعة في المناطق الساحلية أو الجبلية. هنالك زراعة ذات كثافة عادية، متوسطة وعالية.

في الزراعة ذات الكثافة المتوسطة يستفيد المزارع بمضاعفة كمية الإنتاج في الدونم نسبةً إلى كثافة الأشجار العادية (٥٦ غرسة بالدونم مقارنة بـ ٢٨ غرسة بالدونم) في أول ٨ سنوات من النمو. أما في الزراعة ذات الكثافة العالية، وهي طريقة جديدة للحصول على أعلى إنتاج في أقل زمن بالدونم، تزرع أشجار الأفوكادو بصورة متقاربة (٣×٣ متر أو ٢,٥ × ٢,٥ متر). عبر هذه الطريقة، يتم الاستفادة من الأرض وشبكة الري بأفضل صورة ممكنة. ولكن على المزارع أن يستعمل نوعاً من التحكم في حجم الأشجار عبر التقليل مع رش هرمون مقزم (Retardant Growth Regulator). عندما يفقد المزارع السيطرة على حجم الأشجار، بحيث تتداخل أغصانها فيما بينها ويقل إختراق الضوء للفروع السفلية، عندها يكون الحل بإزالة بعض الأشجار (عادة يكون ذلك بعد ١٠ سنوات في الزراعة ذات المسافات المتوسطة أو بعد ٥ سنوات في الزراعة ذات المسافات العالية).

جدول رقم ٣: زراعة ذات الكثافة العادية:

الصفن	أبعاء الزرع (متر)	كثافة زرع (شجرة /الذنف)	بءة الإنتاج (سنة)	قمة الإنتاج (سنة)	معدل الإنتاج طن / الذنف
أئنجر	٥×٥ أو ٦×٦	٤٠ أو ٢٨	٤	٨-١٠	١,٧ إلى ٢,٤
فوفرفف	٥×٥ أو ٦×٦	٤٠ أو ٢٨	٤	٨-١٠	١,٧ إلى ٢,٤
بنكرتون	٥×٥ أو ٦×٦	٤٠ أو ٢٨	٣	٨-١٠	١,٧ إلى ٢,٤
هاس	٥×٥ أو ٦×٦	٤٠ أو ٢٨	٤	٨-١٠	١,٧ إلى ٢,٤
لامب هاس	تعتمد فف الزرافة ذات الكثافة العالفة لأن هففه الأصناف تنففو أفقففا وقلففلة العرفض وإئنافها أفلى فف الزرافات المكثفة.				
رفء					
ففف الزرافة ذات الكثافة العاءفة لا ففب ترك شجرة الأفوكاءو تصل إلى أففر من:					
• ٦ متر إرففاف الشجرة فف فال ٢٨ شجرة بالذنف.					
• ٥ متر إرففاف الشجرة فف فال ٤٠ شجرة بالذنف.					

جدول رقم ٤: زراعة ذات الكثافة المتوسطة

الصفة	أبعاد الزرع (متر)	كثافة زرع (شجرة/الذنف)	بدء الإنتاج (سنة)	قمة الإنتاج (سنة)	معدل الإنتاج طن / الذنف
أفنفرف	٥×٥ مع فمس	٨٠	٤	٧-٩	٢,٨ إلى ٣,٦
	٦×٦ مع فمس	٥٦	٤	٧-٩	٢,٨ إلى ٢,٥
فوفرفف	٦×٦ مع فمس	٥٦	٤	٧-٩	٢,٢ إلى ٢,٥
بنكرتون	٦×٦ مع فمس	٥٦	٣	٧-٩	٢,٨ إلى ٢,٥
	٤×٤	٦٣	٤	٨-١٠	٢,٨ إلى ٣,٢
هاس	٦×٦ مع فمس	٥٦	٤	٨-١٠	٢,٢ إلى ٢,٥
	٤×٤	٦٣	٤	٨-١٠	٢,٨ إلى ٢,٥
لامب هاس	٥×٥ مع فمس	٨٠	٣	٧	حتى ٣,٦
رفد	٥×٥ مع فمس	٨٠	٣	٨	حتى ٣,٦
ففف الزرافة ذات الكفاففة الففوسطة لا ففب ترك شجرة الأفوكافو تصل إلى أففر من:					
• ٤,٥ متر إرففاف الشجرة فف فال ٥٦ شجرة بالذنف.					
• ٤ متر إرففاف الشجرة فف فال ٦٣ شجرة بالذنف.					
• ٣,٥ متر إرففاف الشجرة فف فال ٨٠ شجرة بالذنف.					

جدول رقم ٥: زراعة ذات الكثافة العالية

الصف	أبعاد الزرع (متر)	كثافة زرع (شجرة / الدنم)	بدء الإنتاج (سنة)	قمة الإنتاج (سنة)	معدل الإنتاج طن / الدنم
أتنجر			٤	٨-١٠	
			٤	٨-١٠	
فويرتي			٤	٨-١٠	
بنكرتون			٣	٨-١٠	
هاس			٤	٨-١٠	
لامب هاس	٣×٣	١١١	٣	٦	٣,٨
ريد	٢,٢٥×٢,٢٥	١٩٨	٣	٦	٥,٥

في الزراعة ذات الكثافة العالية يجب أن لا يتخطى طول الشجرة:

- ٢,٧ متر إرتفاع الشجرة في حال ١١١ شجرة بالدنم.
- ٢ متر إرتفاع الشجرة في حال ١٩٨ شجرة بالدنم.

جدول رقم ٦: الإنتاج (كغ / للشجرة) الذي يمكن تحقيقه في حقل أفوكادو تحت إدارة جيدة

السنة	٣	٤	٥	٦	٧	٨	٩	١٠
الإنتاج كغ / شجرة في زراعة ذات الكثافة عادية	١٠	٢٥	٣٥	٤٥	٥٠	٥٥	٦٠	٦٠
الإنتاج كغ / شجرة في زراعة ذات متوسطة	١٠	٢٥	٣٥	٤٥	٤٥	٤٥	٤٥	٤٥
الإنتاج كغ / شجرة في زراعة ذات عالية	١٠	٢٥	٣٥	٣٥	٣٥	٣٥	٣٥	٣٥
الإنتاج كغ / شجرة في زراعة ذات عالية	١٠	٢٥	٢٨	٢٨	٢٨	٢٨	٢٨	٢٨

٤. ٣. ١٠ زرع مصدات رياح

من خصائص مصدات الرياح أن تكون سريعة النمو ودائمة الإخضرار وجذورها تنمو بشكل عامودي حتى لا تزاحم الأشجار على الماء والغذاء. في المناطق التي تتعرض لهبوب رياح مستمر، تساعد مصدات الرياح على حماية الأشجار المزروعة وعلى زيادة نشاط النحل وبالتالي زيادة عدد الثمار. ينتشر استعمال أشجار السرو أو الكازورينا في لبنان كمصدات للرياح، وتزرع عادة حول معظم البساتين المثمرة (الحمضيات، الموز، الأفوكادو...). هذه الأشجار لديها جذور طاغية مما قد يؤثر سلبيا على نمو وإنتاج أشجار الأفوكادو المحاذية لها بسبب مزاحمتها على المياه والأسمدة ومكان الجذور. لهذا السبب، ينصح هذه الأيام إلى استعمال شجر الأفوكادو أو الخروب بدل السرو أو الكازورينا.

ولإنشاء هذه المصدات، من المفضل ترك شجر الأفوكادو المزروع على حدود البستان من دون تقليم لتكبر وتصل إلى علو مرتفع وبالتالي تصبح مصدات حامية لباقي أشجار الأفوكادو داخل البستان. كما ويسمح هذا المصد بمرور أفضل للهواء خلال فصل الشتاء وبالتالي حماية أفضل من الصقيع.

أشجار صنف الباكون و/ أو الأتنجر (نمط تزهر B) تنمو بشكل عامودي وترتفع عاليا مما يجعل منهم مصدات مقبولة جدا للرياح، ولديهما أيضا ميزة توفير حبوب اللقاح لأصناف أخرى مثل الهاس والبنكرتون (نمط تزهر A). بينما صنف اللولا (نمط تزهر A) هو أيضا من اشجار الأفوكادو العالية

والتي تنمو بشكل عامودي أقوى من الأتاجر والفويرتي، مما يجعلها مصدات للرياح مقبول جدا ولديها أيضا ميزة توفير حبوب اللقاح لصنف الاتاجر أو الفويرتي (نمط تزهير B).

في المناطق الساحلية ينصح بزرع أشجار الموز بين شتلات الأفوكادو (زراعة ذات الكثافة العادية والمتوسطة) للسنتين الأولى والثانية، حيث تنمو شجرة الموز بسرعة وتؤمن مناخاً مفيداً من الرطوبة والحماية الضرورية لشتل الأفوكادو المزروع حديثاً وتحميها بالتالي من الرياح. ثم يتم إزالة الموز بعد سنتين لتفسح المجال لنمو أشجار الأفوكادو. وبهذه الطريقة يكون المزارع قد استفاد من إنتاج الموز على مدار سنتين قبل البدء بإنتاج ثمار الأفوكادو.

١.٣.٥ زراعة النصب:

يعتبر أول الربيع و/أو آخر الصيف (تشرين الأول) أفضل الأوقات لزراعة شتول الأفوكادو. تتم هذه العملية كالتالي:

تجهيز الحفر: يتم حفر حفرة أوسع قليلاً من حجم الوعاء أو كيس الغرسة، أما العمق فهو يساوي طول الوعاء أو الكيس. عادة ما تكون الحفرة بعمق حوالي ٥٠ إلى ٦٠ سم. إذا كانت الحفرة عميقة أكثر من اللزوم، قد يؤدي هذا إلى احتمال وصول التربة إلى نقطة إلتهام الطعم وهذا غير مستحب. ينبغي أن تكون نقطة إلتهام الطعم مرتفعة بما لا يقل عن ٢٥ سم عن سطح التربة لتفادي الأمراض الفطرية.

التسميد:

□ يتم بالأسمدة العضوية قبل الزراعة لإغناء التربة بالمواد العضوية، خاصة التربة الرملية أو التربة الطينية، أو أي تربة فقيرة بالمواد العضوية. يمكن تحقيق هذا عبر وضع السماد العضوي قبل شهر على الأقل من الزرع في الحفرة. إذا كان هذا غير ممكن لسبب ضيق الوقت أو التأخير في تحضير الأرض توضع المواد العضوية بعد شهر من الزراعة.

□ بالأسمدة الكيميائية عند الغرس:

- ٥٠٠ غرام من السوبر فوسفات يخلط جيداً ويغطى بحوالي ١٠ سم من التراب.

- ١٥ غرام من سلفات النحاس

- ينبغي عدم وضع لا سماد أزوتي ولا بوتاسي في الحفرة عند غرس النصب.

زرع غرسة الأفوكادو: دون مس جذورها لتظل الجذور ملتصقة مع الكتلة الترابية الأساسية. ملئ الحفرة بتراب ناعم على أن يكون هذا التراب خالياً من الكتل الترابية المتحجرة لتجنب حصول فراغات هوائية يقطع الاتصال بين الجذور والتربة.

تثبيت الشتلة بدعامة خشبية.

ري الغراس:

- ري الغراس مباشرة بعد الزراعة، وتكتفى بـ ٢٠ ليتر من المياه للغرسة. عند استعمال نظام الري بالتنقيط ينبغي أن يكون النقاط قريب من الجذع مباشرة فوق الكتلة الترابية حتى تصل المياه إلى كتلة الجذور.

- قبل هطول أمطار الشتاء، ينبغي تكسير الأحواض الدائرية حول الشتل (التي قد تنشأ عند طمر الغراس) لتجنب تجمع المياه في هذه الأحواض.

- بعد حوالي ٤ أشهر، يمكن إبعاد نظام التنقيط عن الجذع إلى مسافة ٢٠ سم، وهذا يمنع إبقاء الجذع رطباً ويقلل احتمالات ظهور مرض تقرح جذع الأفوكادو.

- عند إنقطاع المطر، ينبغي أن تروى الغراس الجديدة كل ٣ أيام بحوالي ٢٠ ليتر من الماء للغرسة الواحدة في الشهرين الأولين وحتى الشهر الرابع حين تنتشر الجذور في التربة.

- بعد سنة على الغرس ومع نمو أشجار الأفوكادو من المستحسن إضافة خطر ري بالنقطة جديد من الجهة الأخرى للشجرة (في حال لم يتم تمديده في البداية). من المستحسن تفادي نظام الري بالرشاشات في بستان الأفوكادو.

- الوقاية من مرض تعفن الجذور أو الفايثوفتورا خلال تأسيس البستان**
- جميع الأصول المذكورة أعلاه ليست مقاومة أو متحملة لمرض عفن الجذور أو الفايثوفتورا، بعد ظهور هذا المرض في على المزارع أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة أثناء زراعة البستان لكي يمنع كل الظروف المناسبة لتكاثر أو إنتقال هذا المرض ومنها:
١. فلاحه الأرض فلاحه عميقة قبل الزرع من ١ متر إلى ١,٥ متر بواسطة الجرافة.
 ٢. حفر خنادق عميقة لتصريف مياه الري والأمطار على حدود الجل وبين صفوف أشجار الأفوكادو المراد زرعها لتخرج المياه الفائضة خارج الجل.
 ٣. زيادة المواد عضوية في الحفرة قبل الزرع بشهر على الأقل وذلك لتحسين بنية التربة.
 ٤. إضافة مادة الفوسفات مع سلفات النحاس في الحفرة قبل الزرع.
 ٥. استخدام شبكة الري بالتنقيط بدلا من البخاخات.
 ٦. زراعة مطاعيم أفوكادو على شرش ديوك ٧ أو دوزا.

٦. ٣. ١. الغطاء أو الفرشة أو الملش (Mulch)

- تكاثر شجرة الأفوكادو في الغابات الاستوائية وشبه الاستوائية معتمدة على العناصر الغذائية الموجودة في المواد العضوية الناتجة عن تحلل الأوراق التي تتساقط من الشجرة. قبل أن تتحلل هذه المواد العضوية إلى عناصر غذائية يكون لها دور الغطاء الذي يحيط جذع الشجرة ويحمي جذورها السطحية ويسمى هذا بالغطاء أو الملش.
- ما هي فوائد الغطاء أو الملش؟
١. يحسن من محتوى المواد العضوية في التربة وبالتالي يحسن نسيجها.
 ٢. يحسن قدرة الشجرة على امتصاص العناصر الغذائية الموجودة في التربة وفي المواد العضوية المكون منها الملش.
 ٣. يعزز من نشاط الكائنات الحية الدقيقة المعادية لفطر عفن الجذور وبالتالي فهو عنصر مهم في برنامج الإدارة المتكاملة لمرض تعفن الجذور (فايتوفتورا).
 ٤. يساعد في كبت نمو الأعشاب الضارة (يمنع إنبات بذور الأعشاب البرية).
 ٥. يحافظ على رطوبة التربة.
 ٦. يحفز من نمو الشعيرات الماصة الصغيرة




- (الجذور الدقيقة) التي تغذي الشجرة، كما ويعمل كعازل يحمي هذه الجذور. هذه الشعيرات الصغيرة والكثيفة تعيش تحت هذه الطبقة الغنية بالمواد العضوية وهي حساسة وضعيفة وسريعة الجفاف بما أنها سطحية، وهي أيضا بحاجة إلى نسبة عالية من الأوكسجين لتكون فعالة. عادة ما تموت هذه الجذور عندما تتعرض لنقص الأوكسجين نتيجة الري المكثف أو ضعف في تصريف مياه الري والأمطار أو عندما تتعرض لحرارة عالية أو أشعة الشمس المباشرة (في حال إزالة الملش).

صورة ٥: ملش مكون من الأوراق تحت شجرة أفوكادو



صورة ٦: جذور شجرة الأفوكادو السطحية في حال إزالة الملش

لهذه الأسباب ينبغي أن يكون الملش خشن بما فيه الكفاية ليتحلل ببطء مع السماح بتصريف مياه الري والأمطار، كما ينبغي تركه دائم الرطوبة تحت الشجرة. يوضع الملش مباشرة بعد الزرع على شكل دائري حول الغرسة وبقطر حوالي ١٥٠ سم، أما السماكة فالأفضل أن تكون ١٠-١٥ سم. ينبغي عدم لصق الملش بجذع الشجرة لأن ذلك قد يؤدي إلى أمراض فطرية تصيب الجذع (إبعاد بحوالي ٥ إلى ١٠ سم). على المزارع أن يستمر بتعزيز هذا الملش حتى تصبح الشجرة كبيرة وقادرة على توفير هذا الغطاء باستمرار وذلك عن طريق تراكم أوراق الأفوكادو عبر المواسم مكونة طبقة من المواد العضوية. في الحقول المزروعة حديثاً من الممكن أن يُستخدم ورق في أواخر فصل الشتاء أو أوائل الربيع (في هذه الفترة يكون ورق الموز متوفر بكثرة لأنها فترة تنظيف حقول الموز) يُوزع ورق الموز حول أشجار الأفوكادو بسماكة ١٥ سم. ومع نمو شجر الأفوكادو وعندما يصبح تقليم الأفوكادو ضرورة، تفرم جميع المخلفات الناتجة عن التقليم بما فيها الأغصان وتترك تحت الشجر.



الرسم البياني رقم ١: توزيع جذور الأفوكادو (بالنسبة المئوية من إجمالي الجذور) بحسب عمق التراب



صورة ٧: طريقة خاطئة للملش باستخدام الكومبوست

زراعة الغطاء أو الملش

يواجه بعض المزارعين في لبنان صعوبة في تأمين مواد تستخدم كملش وذلك لعدم توفره محلياً (خاصة في المناطق العالية التي لا يزرع فيها الموز) بالإضافة إلى أعباء تكاليف النقل على المزارع. للتخفيف من هذه الأعباء يمكن زراعة بعض المزروعات داخل الحقل مباشرة أثناء زرع شتول الأفوكادو أو قبلها. بعض المحاصيل التي يمكن زراعتها تشمل ما يلي:

موسم الربيع / الصيف: زراعة اللوبياء بمسافات ٤٠ سم × ١٠٠ سم على النقاطات الموجودة في خط الري (GR) في أواخر شهر آذار أو أول شهر نيسان. تنبت اللوبياء بسرعة وبعد حوالي ٥٠ يوم من زراعتها تغطي أوراق اللوبياء الأرض بالكامل بما فيها التربة حول غراس الأفوكادو. عندما ينتهي الحصاد في شهر حزيران، يقوم المزارع بقلع نبات اللوبياء وبتجميعها بالتساوي وحسب الحاجة حول كل غرسة أفوكادو. يمكن تكرار هذه العملية في السنة التالية.

موسم الخريف / الشتاء: زراعة فول بمسافات ٨٠ سم × ١٠٠ سم على نقاطات الري (GR) في منتصف أيلول. بعد حوالي ٦٠ يوم من زراعتها تغطي نباتات الفول الأرض بالكامل بما فيها غراس الأفوكادو. عندما ينتهي حصاد الفول، يقوم المزارع بقلع نبات الفول في شباط من السنة الثانية والذي يوزع بالتساوي وحسب الحاجة على غراس الأفوكادو. بهذه الطريقة خلال السنة الأولى يكون هناك ما يكفي من ملش (اللوبياء + الفول) وبالتأكيد مردود مادي جيد نتيجة بيع محصول اللوبياء والفول.



الفصل الثاني: العمليات الزراعية السليمة



الفصل الثاني:

العمليات الزراعية السليمة للأفوكادو

٢. ١ التقليم

٢. ١. ١ أهداف تقليم

• **تنظيم عملية النمو أي توجيه النمو حسب الشكل المطلوب وحسب الصنف والمسافات المزروعة.** تنمو أشجار الأفوكادو بشكل غير منتظم وتختلف أشكال نموها حسب الصنف، وبالتالي كل صنف له إحتياجات وطريقة تقليم مختلفة وأيضاً حسب الكثافة المزروعة. على سبيل المثال، الفويرتي هو صنف قوي ينمو على شكل مظلة واسعة ومنتشرة، في حين الهاس ينمو بإعتدال أفقياً عرضياً، أما صنف البينكرتون فهو متوسط النمو ويمتد على شكل شمسية. تزرع عادة هذه الأصناف بكثافة عادية أو متوسطة وهي ليست بحاجة إلى تقليم كثيف إلا عند الحاجة. أما الأصناف الأخرى مثل الأتندر، الباكون، الزوتانو، الريد والامب هاس فهي أصناف قوية تعلو وتستقيم لتصبح أشجار عالية. يمكن الاستفادة من التقليم الرأسي لمنع النمو أفقياً ولإجبار أو تحفيز النمو الفرعي فتصبح الشجرة متراسة أكثر. هذا النوع من التقليم الرأسي يقلل من خطر الرياح والكسر، كما يؤدي إلى زيادة الإثمار على أطراف الشجرة حيث يمكن قطف هذه الثمار بسهولة أكبر. إزالة الفروع المنخفضة لتسهيل الري بالرششات أو رش الأسمدة أو أي عملية أخرى على أن تبقى في حدها الأدنى لأن ذلك قد يسبب المزيد من قوة النموات الأفقية للشجرة. كل ذلك يستدعي المتابعة المستمرة والسيطرة على ارتفاع أشجار الأفوكادو لأنها تستعيد طولها الأصلي بسرعة.

• **تحسين كمية وحجم ونوعية الثمار.** شجرة الأفوكادو تثمر على النموات الجديد المتوجدة على أطراف الشجرة وتكثر الثمار في أعلى الأفرع. تنخفض جودة هذه الثمار عندما تكون هذه الأشجار عالية جداً وكثيفة، تظل بعضها البعض. التقليم الجائر أو إزالة النموات الجديدة يقلل من الإثمار. للتخفيف من التأثيرات السلبية للتقليم يتم إزالة البراعم والفروع غير المرغوب فيها قبل أن يتم تشكيلها.

• **الحد من حجم الشجرة مع زيادة الفروع المثمرة.** الأفوكادو من الأشجار السريعة النمو، وإذا تركت لحالها يمكن للشجرة أن تصل إلى إرتفاع ١٥ متر وقطر ١٢ م في غضون ١٥ إلى ٢٠ عاماً. أشجار الأفوكادو الكبيرة تنتج أحياناً كميات هائلة من الثمار ولكن تكاليف القطف والمكافحة في هذه البساتين مرتفعة وصعبة، مع العلم بأن عدد كبير من أشجار صغيرة الحجم في الدوم الواحد تنتج كمية أكبر مع مجهود وتكاليف مادية أقل. إستخدام أصول مقزّمة هي خيار ناجح في الكثير من الأشجار المثمرة ولكن لا يتوفر هذا الأمر في الأفوكادو، حيث لم يتم العثور حتى الآن على أصول تقزيم مناسبة للأفوكادو، ولا يوجد أبحاث كافية يمكن على أساسها التوصية بأفضل حجم أو شكل للشجرة للحصول على أفضل إنتاج.

- **تخفيض التكاليف وتحسين الربحية بواسطة خفض الكلفة التشغيلية.** القيمة الرئيسية من التقليم هو إنشاء وإدارة بستان يسهل فيه إتمام عملية القطف، مكافحة الآفات، والري.
- **إيصال الضوء وأشعة الشمس إلى مختلف أجزاء الشجرة.** البساتين ذات كثافة شجر عالية هي الأكثر احتياجاً للتقليم للسماح بنفاذ الضوء والهواء إلى الكتلة الورقية قدر المستطاع. أما البساتين ذات الكثافة العادية هي الأقل احتياجاً للتقليم أو لتقليم خفيف للحفاظ على المجموع الورقي للشجرة لزيادة حجمها بسرعة لكي يزيد إنتاجها.
- **تسهيل مكافحة الآفات.**
- **التخلص من الأجزاء المريضة في الشجرة.** يؤدي إلى منع انتقال الأمراض وخاصة الفطرية. يتم ذلك عن طريق قص الأجزاء المريضة وحرقتها خارج البستان.
- **تحسين صحة الأشجار ومساعدتها على التعافي من مرض التعفن (فايتوفتورا) واستعادة قوتها.**
- **التقليل من احتياجات مياه الري والأسمدة.**
- **تسهيل القطف.**

٢. ١. ٢ التوقيت الأنسب للتقليم

توقيت التقليم يعتمد على ما هو مطلوب من التقليم. لا يوجد قاعدة واحدة للتقليم يمكن تعميمها على كل بساتين الأفوكادو، لكل صنف أو كثافة زرع طريقة تقليم. يستخدم التقليم في الربيع لتنشيط الأشجار وتشجيع النموات الجديدة، بينما التقليم في أواخر الصيف أو الخريف يستخدم للسيطرة على حجم الشجرة وشكلها.

التقليم في الشتاء (كانون ثاني): لا ينصح بذلك لأنه قد يقلل من عقد الثمار وقد يعرض الشجرة إلى الإصابة بالأمراض الفطرية، كما يؤدي إلى نضوج الثمار في وقت مبكر.

التقليم في الربيع (نيسان): هو أفضل وقت لتنشيط الأشجار وتشجيع نموات جديدة (عادة في الأشجار الصغيرة أو الضعيفة غير المنتجة).

التقليم في منتصف الصيف: يسبب يباساً للأفرع وتكون النموات الجديدة عرضة لحرق الشمس. لا ينصح بذلك أبداً.

التقليم في أواخر الصيف أو الخريف (خلال شهري تشرين أول وثاني): يستخدم للسيطرة على حجم الشجرة وشكلها. (عادة على الأشجار الكبيرة والمنتجة).

٢. ١. ٣ المبادئ العامة في التقليم

- إزالة الفروع الكبيرة والفروع الصغيرة والفروع المزهرة غير المرغوب فيها.
- اختيار الفروع الرئيسية للشجرة.
- قطع بعض الفروع الأفقية النامية والمنخفضة على الأرض (التي تنمو قريبة من التراب) التي تعيق الوصول إلى الشجرة والتي ليس لها فائدة في المسقى.
- إقامة فتحات صغيرة في مظلة الشجرة تسمح لأشعة الشمس بالوصول إلى داخل الشجرة.
- إزالة جميع الأفرع اليابسة باستمرار.
- تخفيف من النموات الجانبية وإزالة البراعم المائية المستقيمة والقوية.

٢. ١. ٤ أشكال التربية

شكل المظلة مع فتح قلب الشجرة، وعادة تكون للأصناف ذات النمو المنتشر مثل الفويرتي، الهاس والبنكرتون

- يتم المحافظة على طول محدد للشجرة يساوي ٨٠% من مسافة الموجودة بين الشجرة و الأخرى في نفس الصف.
- يتم فتح قلب الشجرة
- يتم تبنييد طفيف لجوانب المظلة سنويا للحفاظ على عرض الشجرة



صورة ٧: شكل المظلة مع فتح قلب الشجرة






شكل عامودي للأصناف القوية النمو والعامودية كالأنجر، البايكون، الزوتانو، الريد والامب هاس.


- يتم المحافظة على طول محدد للشجرة يساوي ٨٠% من مسافة الموجودة بين الشجرة و الأخرى في نفس الصف.
- يتم الاحتفاظ بفرع قوي مستقيم في وسط الشجرة.
- يتم تقليم أطراف الأفرع الجانبية بعد عقد الزهر سنويا.



صورة ٨: الشكل العامودي

جدول ٧: طرق مختلفة للسيطرة على حجم الشجرة وتحسين إختراق الضوء إلى داخل
بستان الافوكادو

 (صورة رقم ٩)	١. تخفيف الأغصان: قطع إثنين من الأفرع: كل عام يتم قطع الفرع الأعلى ليعود إلى الإرتفاع المطلوب كما ويقطع الفرع الثاني الذي يكون أكثر نشاطا في الشجرة (صورة رقم ٩). هكذا تكون الشجرة في إنتاج و تجدد مستمرين.	١. تخفيف الأغصان:
 (صورة رقم ١٠)	٢. تقسيم الشجرة إلى أربع أو خمس فروع الرئيسية كل سنة يتم قطع فرع من جهة واحدة في جميع الشجر الموجودة في البستان. هذه طريقة بسيطة وسهلة للعمال و تكون الشجرة في إنتاج و تجدد مستمرين (صورة رقم ١٠)،	٢. تقسيم الشجرة إلى أربع أو خمس فروع الرئيسية
٣. التخفيف من عدد الأشجار عن طريق إزالة الخمس إزالة عدد من الأشجار أو إزالة الخمس أو الشجرة الخامسة (صورة رقم ١١). تُعتمد هذه الطريقة عندما تتداخل أشجار الافوكادو ببعضها البعض، عندها يقوم المزارع بإزالة الشجرة الخامسة في بداية فصل الربيع (فقط) عندما تبدأ درجة الحرارة بالإرتفاع. تستخدم هذه الطريقة في الزراعات المكثفة حيث الاشجار كانت منذ البداية مزروعة على مسافات أقرب من تلك الموصى بها.		٣. التخفيف من عدد الأشجار عن طريق إزالة الخمس
 صورة لبستان الافوكادو بعد إزالة الخمس	 صورة لبستان الافوكادو يظهر حجم الشجرة قبل إزالة الخمس	 صورة لبستان الافوكادو يظهر حجم الشجرة قبل تداخل الأغصان ببعضها
صورة ١١		

يتم قطع جميع الفروع مباشرة فوق الطعم (صورة رقم ١٢) مع بداية فصل الربيع (فقط) عندما تبدأ درجة الحرارة بالارتفاع. فوراً يتم دهن الجذع والفروع المعرضة لأشعة الشمس بالكلس لحمايتها من الحروق (صورة رقم ١٢). ينبغي تجنب هذا النوع من التقليم في فصل الشتاء. عادة يتم استعمال هذه الطريقة عندما تكبر شجرة الأفوكادو كثيراً في الحجم فتصبح عملية القطاف والمكافحة غير ممكنة.  (صورة رقم ١٣)  (صورة رقم ١٢)	٤. التقليم الجائر أو التجديدي
تقليم كل الشجر في نفس الخط الممتد جنوباً إلى الشمال بشكل هرمي. هذه الطريقة تُعرض أسطح الشجر في الخط الواحد لمزيد من الضوء أي مزيد من الإنتاج. عادة تكون للأصناف عامودية الشكل مثل الألتنجر، البايكون، الزوتانو، الريد والامب هاس. 	٥. التقليم المخروطي أو الهرمي

٢. ٢ الريّ

٢. ٢. ١ إحتياجات شجرة الأفوكادو من المياه

- من النقاط الاساسية المتعلقة بريّ شجرة الأفوكادو مايلي:
- هي شجرة دائمة الإخضرار وهي بحاجة إلى تربة رطبة حول جذورها. لذلك تحتاج إلى ريّ دائم خاصةً عندما يتوقف المطر.
- في حال تعرض شجرة الأفوكادو إلى العطش تبدأ أوراقها وثمارها بالتساقط.
- تحصل شجرة الأفوكادو على ٨٠٪ من المياه من أعلى ٦٠ سم من التربة لأن لديها مجموع جذري سطحي.
- تحتاج شجرة الأفوكادو الى مياه ريّ عالية الجودة حيث لا تتجاوز نسبة الأملاح الذائبة عن ٥٠٠ جزء بالمليون لأنها شجرة حساسة جداً تجاه الأملاح وخاصة الكلور (تجنب الأسمدة التي تحتوي على الكلور).
- ما هي حاجة شجرة الأفوكادو للمياه:

كمية المياه المستخدمة من قبل شجرة الأفوكادو تتعلق بحجمها وبالظروف المناخية السائدة. لحساب الاحتياجات المائية لشجرة الأفوكادو يمكن استخدام هذه المعادلة:

$$Q = A \times ETo \times Kc$$

Q = كمية المياه المطلوبة للري (ليتر / الساعة)

A = مظلة الشجرة التي تغطي الأرض (متر مربع)

ETo = التبخر (ملم) (جدول رقم ٧)

Kc = هو رقم نسبي يقاس حسب حجم الشجرة، فترة النمو، والظروف المناخية. هذا الرقم مُثبت من

قَبْل منظمة الأغذية العالمية (FAO) ويساوي ٨٠٪

جدول ٨: التبخر (ملم) في المناطق الساحلية اللبنانية

الشهر	ETo - ملم / اليوم
أذار	٣,١٩
نيسان	٣,٧
أيار	٤,١٩
حزيران	٤,٨٣
تموز	٥,٩
أب	٥,٩
أيلول	٥,٣
تشرين الأول	٤,١٩

مثال على حساب كمية المياه التي تحتاجها شجرة الأفوكادو

المكان: بستان أفوكادو في منطقة الزهراني، جنوب لبنان في تربة طينية.

الزمن: شهر نيسان.

مظلة الشجرة: لها قطر ٤ متر. وبالتالي فإن مظلة الشجرة التي تغطي الأرض (متر^٢) =

$$\pi r^2 = \pi (4/2)^2 = 3,14 \times 4 = 12,6 \text{ م}^2$$

التبخر (ملم) في لبنان المنطقة الساحلية حسب الجدول: ٣,٧ ملم = ٠,٠٠٣٧ متر^٣

لحساب الاحتياجات المائية لشجرة الأفوكادو يمكن استخدام المعادلة:

$$Q = A \times ETo \times Kc$$

$$12,6 \text{ م}^2 \times 0,00373 = 0,047 \text{ م}^3$$

١ م^٣ = ١٠٠٠ ليتر وبالتالي ٣٧ ليتر للشجرة باليوم

٢. ٢. ٢ أنظمة الري الحديثة (شبكة الري)

إنشاء نظام ري حديث هو أحد أهم العناصر الضرورية لنجاح بستان الأفوكادو. يُنصح دائماً باستعمال نظام الري بالتنقيط لأنه الأكثر حماية للشجرة من مرض عفن الجذور (الفايتوفتورا).

في نظام الري بالتنقيط، هناك طريقتين لمدّ أنابيب الري:


١. مدّ أنابيب الري (GR) بشكل مستقيم ومتوازي كل ١ متر لتغطية كل مساحة الأرض تحت مظلة

الشجرة (صورة رقم ١٥). تعتمد هذه الطريقة في بساتين الأفوكادو حيث شكل وحجم الأشجار متجانس.



صورة ١٥: توزيع أنابيب الري بفواصل متر تحت مظلة الشجرة.

٢. مدّ الأنبوب بشكل دائري تحت مظلة (كفية) الشجرة (صورة رقم ١٦). تُعتمد هذه الطريقة في بساتين الأفوكادو حيث وحجم الأشجار مختلف فنجد الأشجار الصغيرة والأشجار الكبيرة معا في نفس البستان وبالتالي إختلاف حاجة الري بين الشجرة الكبيرة والصغيرة، ينبغي التأكد من عدم إعطاء الاشجار الصغيرة أو الضعيفة كمية مياه أكثر من حاجتها كي لا يؤدي ذلك الى موتها. هذه الحالة موجودة في كثير من بساتين الأفوكادو في لبنان .



صورة ١٦: توزيع أنابيب الري على شكل دائري حول كل شجرة تحت مظلتها.

مواصفات أنبوب الريّ

أنبوب (GR) ١٦ ملم + نقاط كل ٤٠ سم وهو متوفر في لبنان.
٢,٥ نقاط بالمتر طول مع تدفق ٤ ليترماء بالساعة / نقاط الواحد أو تدفق ١٠ ليترماء كل ١ متر طول.

ملاحظة: لا يمكن مد هذا الانبوب (GR ١٦ ملم + نقاط كل ٤٠ سم) أكثر من ٥٠ متر. يمكن إستخدام أنابيب ٢٠ ملم للمسافات الأطول أو حسب خريطة الريّ موضوعة من قبل مهندس ري متخصص.

حسابات ينبغي على المزارع أن يعرفها في الريّ:

في نظام الري بالتنقيط حيث الأنابيب ممدودة بالتوازي بفواصل متر على طول القسم من البستان لتغطية كامل مساحة الأرض.

مواصفات الأنبوب المستخدم: (GR) ١٦ ملم + نقاط كل ٤٠ سم

في مسلة ١٠٠٠ متر هناك ١٠٠٠ متر أنبوب GR

كل متر أنبوب GR يوجد فيه ٢,٥ نقاط اي ما يساوي ٢٥٠٠ نقاط في الدنم.

بحسب المثل المذكور سابقا فإن مساحة مظلة الشجرة = ١٢,٦ متر^٢

كم نقاط يوجد في ١٢,٦ متر^٢ ؟ $12,6 \times 2500 = 31500$ / ١٠٠٠ = ٣١ نقاط × ٤ لتر في الساعة = ١٢٤ لتر بالساعة (هي كمية المياه التي تستفيد منها الشجرة بالساعة).

٢. ٢. ٣ كفاءة الريّ

معظم أنظمة الريّ بالتنقيط مصممة بشكل جيد ولديها كفاءة حوالي ٩٠٪، لذلك هناك حاجة لإضافة ١٠٪ من المياه للتعويض.

يمكن للمزارع أن يقدّر كفاءة شبكة الري التي يملكها (كل حالة على حدة) بتطبيق ما يلي:

حساب كفاءة الريّ

لنفترض أن كفاءة نظام الريّ هي ٩٠٪

بحسب المثل الموضوع سابقاً فإن الاحتياجات المائية لشجرة الأفوكادو المزروعة على الساحل (لها قطر مظلة ٤ أمتار وفي شهر نيسان) حسب استخدام المعادلة السابقة = ٢٧ لتر للشجرة باليوم


٢٧ لتر/يوم $\times ١,١$ (إضافة ١٠٪ لإيصال الكفاءة إلى ١٠٠٪) = ٤٠ لتر يوميا وهي حاجة الشجرة لمياه الري.

تدفق المياه/شجرة/ساعة = ١٢٤ لتر في ٦٠ دقيقة (من المثل السابق)

$٤٠ \times ٦٠ / ١٢٤ = ١٩,٤$ دقيقة في اليوم


نحن بحاجة إلى ري حوالي ٢٠ دقيقة كل يوم.

إذا كان المزارع يستخدم مصدر مياه مكشوف عليه تزويد نظام الريّ بفلتر رملي (Sand Media Filter) (صورة ١٧) مع دسك فلتر (Disk Filter) للتأكد من أن المياه العابرة في أنابيب الري نظيفة ولن تُسدّ النقاطات (Drippers) أو البخاخات (Sprinklers) في المستقبل.



صورة ١٧: فلتر رملي وكيفية عمله

إذا كانت مياه الري تحتوي على رمل فلا بد من استعمال مزيل الرمل (Hydrocyclone) (صورة ١٨).



صورة ١٨: مزيل الرمال

الريّ بالجَرّ


الريّ بالجَرّ لا يزال معتمداً في لبنان على الافوكادو. لا يُنصَح بهذه الطريقة أبداً لأنها تزيد من احتمال إنتشار مرض عفن الجذور كما تستهلك كميات كبيرة من المياه. على المزارع الإسراع في تركيب نظام الريّ بالتنقيط بدلاً من الريّ بالجَرّ.

٢. ٣ العناصر الغذائية وأعراض النقص

تتألف العناصر الغذائية اللازمة للنموّ من العناصر الكبرى التي تحتاجها الشجرة بكميات كبيرة والعناصر الصغرى التي تحتاجها الشجرة بكميات صغيرة. في الجدول ٩ و ١٠ وصف لوظائف هذه العناصر وعوارض النقص.

جدول ٩: وظائف العناصر الكبرى وعوارض نقصها

العناصر الكبرى	الوظائف	عوارض النقص
١ - الأزوت	إنتاج الكلوروفيل (مطبخ الشجرة)	نمو بطيء وتقرّم مع ضعف في الانتاج
	تكوين الأحماض الأمينية التي تتحول إلى بروتينات (طعام الشجرة)	إصفرار في الأوراق القديمة
	تكوين الانزيمات (هرمونات الشجرة أو المقويات)	
٢ - الفوسفات	تخزين ونقل للطاقة	ضعف في النمو مع سقوط نسبة كبيرة من الثمار قبل النضوج
	تحفيز الجذور على النمو وخاصة في الطقس البارد	ابيضاض بين الشرايين في الاوراق الجديدة
	قليل الفعالية في الطقس الحار (لا ينفع حقنه في الصيف)	ظهور تبقّعات على الاوراق في حالات النقص الحاد
٣ - البوتاس	نقل السكريات (نقل الطعام للشجرة)	إحتراق رؤوس وأطراف الاوراق القديمة
	فتح وإغلاق الخلايا المسؤولة عن التبخر الموجودة في أسفل الأوراق (مقاومة الحر والجفاف)	نمو بطيء
	زيادة القدرة على تحمّل البرد (مقاومة البرد)	
	زيادة القدرة على تحمّل الأمراض (مقاومة الأمراض)	موت الاغصان الصغيرة
	زيادة حجم الثمار وتحسين نوعيتها	ثمار صغيرة الحجم

	٤ - الكالسيوم	تكوين جدران الخلايا (قوة الشجرة)	إحتراق أطراف الاوراق الجديدة
		إنتاج الخلايا الجديدة (نمو الشجرة)	أغصان ضعيفة أو موت النموات الجديدة بما فيها نموات الجذور
		تقوية الجذور فيجعلها أقل عرضة لمرض عفن الجذور (مقاومة الأمراض)	إخضرار غامق غير طبيعي على الأوراق مع سقوط الأزهار والبراعم قبل الأوان.
	٥ - المغنيزيوم	لإنتاج الكلوروفيل (مطبخ الشجرة)	ابيضاض بين الشرايين في الاوراق القديمة
			التفاف الاوراق الى الاعلى حول الشريان الاساسي للورقة
		منشط لكثير من الانزيمات (هرمونات الشجرة او المقويات)	اصفرار جزء من الورقة ابتداء من الخارج مع وجود اخضرار في وسط الاوراق
	٦ - الكبريت	لتكوين الأحماض الأمينية التي تتحول إلى بروتينات (طعام الشجرة)	لون اخضر فاتح الى الى اصفرار خفيف على الاوراق الجديدة

جدول ١٠ : وظائف العناصر الصغرى وعوارض نقصها

العناصر الصغرى	الوظائف	عوارض النقص
١ - الحديد	إنتاج الكلوروفيل وله دور في التمثيل الضوئي	إصفرار ما بين عروق الاوراق الحديثة النمو.
	التحكم في التبخر ومقاومة الحر والجفاف	الأنسجة بين العروق تتحول تدريجيا إلى لون أصفر، بينما تميل الأوردة للبقاء خضراء.
	تفعيل الانزيمات والهرمونات في الشجرة.	رؤوس وهوامش الأوراق تتحول الى لون بني وتصبح جافة وهشة.

	٢ - الزنك	ينشط الانزيمات المسؤولة عن صناعة بروتينات معينة	تقرّم في النمو
		تكوين الكلوروفيل وبعض الكربوهيدرات.	ظهور بقع صفراء بين عروق الأوراق الحديثة النمو.
		تحويل النشويات إلى سكريات	الثمار صغيرة الحجم
		مساعدة الشجرة على تحمل درجات الحرارة الباردة.	شكل الثمر أكثر كروياً.
		تشكيل هرمون الأوكسين الذي يساعد في تنظيم نمو الأفرع والأعصان.	أوراق صغيرة، وأحياناً طويلة وضيقة
			تجدد على هامش الأوراق.
	٣ - البورون	يتشارك البورون مع الكالسيوم في تركيب جدار الخلية	نمو خضري ضعيف
		يساعد خلايا وانسجة الجذور والأوراق الصغيرة والبراعم الزهرية أن تنمو وتتكاثر بسرعة	تتأثر الأوراق الصغيرة أولاً فتكون ممسوخة، سميكة، هشة
		نقل المياه والمواد الغذائية إلى جميع الأنسجة النامية وأيضاً إلى الثمار النامية.	تظهر إصابات داكنة على البراعم والأفرع الصغيرة فتموت
		يزيد إنتاج الزهور ويحافظ عليها، كما ويعمل على تقوية حبوب اللقاح ونمو الثمار.	لا يمكن لعنصر البورون التنقل بسهولة في الشجرة، فنبقى الأوراق القديمة خضراء
		تنظيم مستويات الهرمونات في الأشجار.	ظهور بقع بنية على الثمار مع تشوهات و قشرة سميكة

٢. ٤ التسميد

تحتاج أشجار الأفوكادو إلى جميع العناصر الغذائية لتنمو. الأزوت، الفوسفور، البوتاسيوم، الكالسيوم، المغنيزيوم، الكبريت، المنغنيز، الحديد، البورون، الزنك والنحاس هم من العناصر الغذائية التي تحتاج لها شجرة الأفوكادو لتنمو بشكل طبيعي. يمكن تأمين هذه العناصر عن طريق التسميد الكيميائي أو التسميد العضوي.

٢. ٤. ١ التسميد الكيميائي

يتم التسميد الكيميائي إما عبر حقن الأسمدة الكيميائية الذوابة داخل شبكة الري بالتنقيط أو نشر الأسمدة الكيميائية المركبة فوق التراب تحت مظلة الشجرة قبل هطول المطر أو الري بالرشاشات أو الري بالجر. يمكن استخدام الطريقتين معا (الأسمدة الذوابة والمركبة) في التسميد. تختلف حاجة أشجار الأفوكادو لكمية العناصر الغذائية حسب حجم الشجرة أو عمرها في البساتين غير المنتجة أو حسب الإنتاج المتوقع بالإضافة إلى العمر وحجم الشجرة في البساتين المنتجة. باستطاعة شجرة الأفوكادو امتصاص الأسمدة الكيميائية حالما يتم حقنها أو توزيعها، أما الأسمدة العضوية فعليها أن تتحلل بواسطة البكتيريا والفطريات الموجودة في التربة قبل أن تتمكن شجرة الأفوكادو من امتصاص

العناصر الغذائية. إن العنصر الغذائي التي تمتصه الشجرة في النهاية هو نفسه بغض النظر عن نوع الأسمدة (عضوية أو كيميائية) ولكن يختلف توقيت توفيرها للشجرة.

تأتي الأسمدة الكيميائية بتركيبات مختلفة. مثلاً سماد ١١-٨-٢١

كل ١٠٠ كغ يحتوي على: ٢١ كغ N أو أزوت

٨ كغ P_2O_5 أو خماسي أوكسيد الفوسفور أو $٨ \times ٤٣ = ٣٠٥$ كغ فوسفات صافي.

١١ كغ K_2O أو أوكسيد البوتاسيوم أو $١١ \times ٨٣ = ٩٠٢$ كغ بوتاس صافي.

التسميد الورقي: هي طريقة في التسميد تقوم على رش الأسمدة الكيميائية المذابة بالماء على أوراق النباتات. لا يُنصح بإعتمادها على أوراق الأفوكادو لأنها شمعية وسميكة وبالتالي لن تمتص الأسمدة. ولكن أثبتت بعض التجارب أن رش الأسمدة الكيميائية (العناصر الصغرى بتركيز ١/١٠٠٠) على زهر الأفوكادو يساعد في تحسين عقد الثمار أي زيادة الإنتاج.

٢. ٤. ٢ التسميد العضوي

هو عبارة عن تغذية أشجار الأفوكادو من المواد الغذائية المتحللة من السماد الحيواني أو السماد العضوي المغم الذي يتم نثره تحت وحول مظلة الشجرة. تحلل هذه المواد العضوية إلى عناصر غذائية للشجرة تعتمد على تفاعلات معقدة في التربة (بكتيريا) مع عوامل بيئية معينة (حرارة ورطوبة) والتي يصعب التنبؤ بها، فيؤدي أحياناً إلى كفاءة أقل بكثير من الأسمدة الكيميائية. في حقول الأفوكادو يُحذَر استخدام التسميد العضوي فقط لتحسين خصائص التربة، حيث يتم خلطه مع التربة الرملية أو الطينية قبل الزرع بشهر على الأقل أو بعد الزرع بشهر.

٢. ٤. ٣ برنامج التسميد:

يتم وضع برنامج التسميد لشجرة الأفوكادو للحصول على:

- نمو جيد لشجرة الأفوكادو وبالأخص الأشجار الصغيرة حتى تنمو بسرعة خلال أول ٣ سنوات لتصل إلى الحجم المنتج أي (قطر مظلة الشجرة ابتداءً من ٢ متر). يجب إزالة جميع الزهر والثمار في أول ٣ سنوات من نمو الشجرة لتحفيز النمو الخضري والجذري فقط (وليس الثمار).
- مناعة قوية للشجرة: التسميد الصحيح يعمل على تقوية مناعة الشجرة لتقاوم الأمراض ولتتحمّل عوامل الطقس الصعبة (حر أو برد شديد).
- زيادة في الإنتاج.
- نوعية عالية من الثمار.

يتم التسميد حسب المراحل الأساسية التي تمر بها الشجرة (جدول ١١). يكون الطلب للعناصر الغذائية عالي وقت الإزهار والعقد، وعند ظهور طرد الربيع أثناء نمو الثمر ثم ظهور طرد الصيف مع نمو الجذور ثم طرد الخريف وما يتخللهم من نمو للثمار في نفس الوقت. على المزارع فهم مراحل النمو التي تمرّ بها شجرة الأفوكادو ويقوم بالتسميد حسب هذه المراحل لضمان إنتاج جيد ومستمر ومربح.

جدول ١١: رسم بياني يوضح مراحل النمو الأساسية التي تمر بها الشجرة الأفوكادو (صنف باكوري) وعلاقتها بالري والتسميد

٢ ك	شباط	آذار	نيسان	أيار	حزيران	تموز	أب	أيلول	١ ت	٢ ت	١ ك	٢ ك	شباط	آذار
مياه أمطار														
مياه ري														
مياه أمطار														
إزهار موسم ١														
عقد الثمار														
نمو طرد الربيع														
نمو طرد الصيف														
نمو طرد الخريف														
نمو حجم الثمار بشكل سريع موسم ١														
قطاف موسم ١														
إزهار موسم ٢														
نمو في الجذور														
عقد الثمار														
تسميد موسم ١														
موسم ٢														

في الجداول التالية تفصيل لإحتياجات بستان أفوكادو (غرام/شجرة/سنة) من الأسمدة الكيميائية حسب مراحل النمو الأساسية

جدول رقم ١٢ : إحتياجات الأزوت (N) من سماد اليوريا × (٠-٠-١٠٠) لشجرة أفوكادو (غرام/شجرة/سنة)

قطر مظلة الشجرة (متر)	نيسان	أيار	حزيران	تموز	أب	أيلول	تشرين الأول	المجموع (غرام/شجرة/سنة)
٢	١٥	٥	٥	٢٠	٢٠	٢٠	١٥	١٠٠
٤	٥٩	٢٠	٢٠	٧٨	٧٨	٧٨	٥٩	٣٩٠
٦	١٢٩	٤٣	٤٣	١٧٢	١٧٢	١٧٢	١٢٩	٨٦٠

× تم إختيار سماد اليوريا لأنه الأرخص حاليا في السوق وفيه أعلى نسبة أزوت حوالي ٤٦٪، وأيضا لأنه لا يؤدي إلى رفع مستوى حموضة التربة.

جدول رقم ١٣ : إحتياجات الفوسفات (P) من حامض الفوسفوريك × ٨٥٪ (٠-٥١-٠) لشجرة أفوكادو (ملم/شجرة/سنة)

قطر مظلة الشجرة (متر)	نيسان	أيار	حزيران	تموز	أب	أيلول	تشرين الأول	المجموع (غرام/شجرة/سنة)
٢	٠	٠	١٦	١٦	٠	٠	٣٢	٦٤
٤	٠	٠	٤٤	٤٤	٠	٠	٨٨	١٧٦
٦	٠	٠	٩٧	٩٧	٠	٠	١٩٤	٣٨٨

× تم إختيار سماد حامض الفوسفوريك ٨٥٪ لأنه الأرخص حاليا في السوق وفيه أعلى نسبة فوسفات حوالي ٥١٪، وأيضا لأنه لا يؤدي إلى رفع مستوى حموضة التربة.

جدول رقم ١٤ : إحتياجات البوتاس من سماد سلفات البوتاس × (٥٠٪) لشجرة أفوكادو (غرام/شجرة/سنة)

قطر مظلة الشجرة (متر)	نيسان	أيار	حزيران	تموز	أب	أيلول	تشرين الأول	المجموع (غرام/شجرة/سنة)
٢	٢٠	٣٥	٣٥	٣٥	٢٥	٢٥	٢٥	٢٠٠
٤	٨٠	١٤٠	١٤٠	١٤٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٧٩٩
٦	١٧٦	٣٠٨	٣٠٨	٣٠٨	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	١٠٧٦١

× تم إختيار سماد سلفات البوتاس (٥٠-٠-٥٠) لأنه الأرخص حاليا في السوق وفيه أعلى نسبة بوتاس حوالي ٥٠٪، وأيضا لأنه لا يؤدي إلى رفع مستوى حموضة التربة. كما وأنه يحتوي على ١٧٪ من عنصر الكبريت الضروري لنمو شجرة الأفوكادو.

جدول رقم ١٥ : إحتياجات الزنك من سماد كبريتات الزنك الهيبوتايدراتي (٢٢٪) لشجرة أفوكادو (غرام/الشجرة/سنة)

قطر مظلة الشجرة (متر)	نيسان	أيار	حزيران	تموز	أب	أيلول	تشرين الأول	المجموع (غرام/شجرة/سنة)
٢	٣٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣٠
٤	٩٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩٠
٦	١٢٠	٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٢٠

جدول رقم ١٦ : إحتياجات الحديد من سماد شيلات الحديد (٦٪ Fe-EDDHA) لشجرة أفوكادو (غرام/الشجرة/سنة)

قطر مظلة الشجرة (متر)	نيسان	أيار	حزيران	تموز	أب	أيلول	تشرين الأول	المجموع (غرام/شجرة/سنة)
٢	٢٠	٢٠	٠	٠	١٠	١٠	٠	٦٠
٤	٦٠	٦٠	٠	٠	٣٠	٣٠	٠	١٨٠
٦	٨٠	٨٠	٠	٠	٤٠	٤٠	٠	٢٤٠

جدول رقم ١٧ : إحتياجات البورون من سماد البوراكس (١١٪) لشجرة أفوكادو (غرام/الشجرة/سنة)

قطر مظلة الشجرة (متر)	نيسان	حزيران	أب	تشرين الأول	كانون الأول	شباط	قطر مظلة الشجرة (متر)
٢	٤	٤	٤	٤	٤	٤	٢٣
٤	١٧	١٧	١٧	١٧	١٧	١٧	١٠١
٦	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٣٩	٢٣٤

قبل وضع برنامج التسميد من المفضل القيام بتحليل ورقي أو تحليل تربة لقياس المحتوى الغذائي في أوراق شجرة الافوكادو أو في التربة، ويتم المقارنة بينهما لتقييم برامج التسميد السابقة. مثلاً، إذا أظهرت نتائج التحليل الورقي أن هناك نقص في عنصر الزنك بينما أظهرت نتائج تحليل التربة أن هناك فائض في هذا العنصر فسوف نستنتج أن خطأ قد وقع في برنامج التسميد السابق والذي أدى إلى تثبيت عنصر الزنك في التربة ليصبح غير متوفر لشجرة الافوكادو. وفقاً لذلك التحليل يتم وضع برنامج تسميد جديد.



الفصل الثالث: الإدارة المتكاملة للآفات



الفصل الثالث: الإدارة المتكاملة للآفات

هناك عدة آفات قد تصيب شجرة الأفوكادو وخاصةً الأمراض الفطرية التي تصيب الجذور، الأوراق، الثمر وحتى الجذع. من أهم هذه الأمراض الفطرية التي تنتشر بشكل واسع في لبنان عفن الجذور (فايتوفتورا) والأنثراكنوز. أما الآفات الحشرية فهي تحت السيطرة بما أن الكثير من الأعداء الطبيعيين (الحشرات المفيدة) تنتشر في بساتين الأفوكادو في لبنان والتي تؤمن مكافحة البيولوجية لمعظم الحشرات الضارة وذلك بسبب قلة استخدام المبيدات الحشرية.

٣. ١ الأمراض الفطرية

٣. ١. ١ مرض التعفن أو الفايثوفتورا

- هو مرض ناتج عن فطر يسمى *Phytophthora cinnamomi* يصيب عدة أعضاء من شجرة الأفوكادو:
- يصيب جذور الأفوكادو ويسمى مرض تعفن الجذور *Phytophthora Root Rot*
 - يصيب أغصان وجذع شجرة الأفوكادو ويسمى مرض تقرح جذع الأفوكادو *Trunk Canker Disease*
 - يصيب ثمار الأفوكادو ويسمى مرض تعفن ثمار الأفوكادو *Avocado Fruit Rot*

مرض تعفن الجذور *Phytophthora Root Rot*

هذا المرض الفطري الذي يصيب الجذور في شجرة الأفوكادو يعتبر من أخطر الأمراض التي تؤدي إلى موت الشجرة. يظهر هذا المرض في الأراضي الطينية القثيرة بالمواد العضوية والبطيئة في تصريف مياه الري والأمطار عوارض المرض

- ذبول شديد يصيب الشجرة.
- إصفرار في الأوراق وتساقطها.
- موت أطراف الأغصان.




صورة ١٩ : عوارض مرض تعفن الجذور

عند إزالة الغطاء (الملش) من تحت الشجرة المصابة بمرض عفن الجذور يظهر ضمور وإسوداد في الجذور بالمقارنة مع جذور الشجرة السليمة التي تظهر بيضاء وكثيفة. كما يمكن لجذور الأفوكادو أن تموت لأسباب عدة أهمها:

- الإجهاد المائي.
- بعض الأمراض الفطرية الناتجة عن الملش.

موت جذور الأفوكادو نتيجة الإجهاد المائي (Stress)

في مرحلة الإزهار (خاصة في الأصناف المتأخرة) والتي تترافق مع وجود الثمار من الموسم السابق وتساقط أوراق الشجرة وبداية عقد الثمار الجديدة ونمو الطرد الربيعي وأحيانا يكون الطقس بارد، كل هذه العوامل مترافقة تجهد الشجرة فيموت جزء من الجذور ويتحول لونها إلى بني أو أسود ولكن وسط الجذر يبقى أبيض (موت بعض الجذور في هذه الحالة ليست بمشكلة خطيرة). أما في حالة مرض عفن الجذور يصبح كامل الجذر أسود حتى داخله كما نري في الصورة أدناه.



صورة ٢٠: مرض تعفن الجذور

الوقاية:

- استخدام أصل برّي مقاوم لعفن الجذور مثل الدوزا أو الديوك ٧.
- تغطية أسفل مظلة الأشجار بغطاء نباتي أو بأوراق الأشجار المتساقطة (الملش) بسماكة ١٥ سم على الأقل.
- إبقاء التربة رطبة بشكل معتدل.
- التأكد من عدم تجمع المياه خصوصاً عند هطول الأمطار.
- حفر خنادق لتصريف مياه الأمطار والري.
- المحافظة على حموضة التربة بين ٥,٥ و ٦ درجات باستخدام الاسمدة التي تخفّض مستوى حموضة التربة.
- في حال إصابة الأشجار بعفن الجذور يتم قطف ثمارها حالما تنضج (خاصة صنف الهاس والريد) أي في أشهر شباط وأذار وعدم الانتظار حتى أشهر حزيران وتموز.

المكافحة

- ١- رش الأشجار المصابة بالفوسيتيل ألومنيوم (٨٠٪ مادة فعالة) أو ٢-٣ كلغ للهكتار أو ٢٥٠ - ٣٠٠ غرام للبرميل (٢٠٠ ليتر ماء)، كل ٦ إلى ٨ أسابيع رشة (فترة التحريم ١٤ يوم). تجنب خلط الفوسيتيل ألومنيوم مع أي مبيد يحتوي على مادة النحاس.
- ٢- حقن الأشجار المصابة بالفوسيتيل ألومنيوم وهي أكثر الطرق فعالية. حتى يمكن اعتماد هذه الطريقة ينبغي أن يكون قطر جذع الشجرة أكثر من ٤ سم ومظلتها أكثر من ٢ متر. يتم حقن الدواء فقط عندما تكون الحرارة فوق ٢٣ درجة مئوية. يمكن تحديد نسبة الإصابة بمرض عفن الجذور عن طريق

- معاينة مستوى سقوط الورق في فترة الإزهار.
- الأشجار السليمة: لا يوجد سقوط ورق، يتم فقط رش الدواء مرتين أو ثلاث في أيار، أيلول وتشيرين ثاني.
- الأشجار مصابة بالمرض: سقوط حوالي ٣٠٪ إلى ٦٠٪ من الورق، يتم حقن الدواء مرتين في أواخر نيسان / أيار والثانية في تشيرين أول.

تحضير محلول الحقن:

يتم قياس قطر مظلة الشجرة بالمتر. تحدد كمية المحلول كالتالي:
 كمية محلول الفوسيتيل ألومنيوم = قطر الشجرة X ١٥
 مثلاً شجرة مصابة بالمرض قطرها ٤ متر. $15 \times 4 = 60$ ملم من محلول الفوسيتيل ألومنيوم.
 كل حقنة هي عبارة عن ٢٠ ملم (٢٠ ملم من المحلول في كل حقنة) أي ٣ حقن للشجرة.
 نسبة المادة الفعالة في كل حقنة يجب أن تكون ٢٠٪.
 عند استخدام فوسيتيل ألومنيوم (٨٠٪ مادة فعالة) يحلل ١٥ غرام فوسيتيل ألومنيوم بـ ٦٠ ملم ماء لكل شجرة قطرها ٤ متر أو كيلو فوسيتيل ألومنيوم بـ ٤ لتر ماء.
 قبل الحقن يتم خرق جذع الشجرة بريشة ٤ ملم ويعمق ٢ سم.

في حال تواجد المرض في البستان ينبغي أن ترش أو تحقن جميع الأشجار كل عام.



صورة ٢١: خطوات حقن شجرة الأفوكادو

مرض تقرح جذع الأفوكادو Trunk Canker Disease

عوارض المرض

تظهر العوارض على شكل بقع بنية داكنة اللون وتتطور حتى يبدأ ظهور إفرازات بيضاء اللون في المنطقة المصابة. وجود هذه الإفرازات البيضاء لا تشير بالضرورة إلى هذا المرض لأن أي إصابة في الجذع قد تنتج نفس ردة الفعل.

الوقاية والعلاج

- قطع جميع الأغصان المريضة.
- تنظيف القشرة الخشبية قدر الإمكان.
- إبعاد القشرة الخارجية للجذع المصابة
- بالإضافة إلى كل الأغصان المريضة خارج الحقل.
- إستبدال نظام الري بالرشاشات أو إبعاد
- المرشة عن الجذع لتجنب إنتشار المرض.
- دهن المنطقة المصابة بمزيج من فوسيتيل ألومنيوم.

مرض تعفن ثمار الأفوكادو Avocado

Fruit Rot

عوارض المرض

- يصيب هذا المرض غالباً الثمار المعلقة على
- الأفرع المنخفضة الملاصقة للتربة الملوثة بالعفن.



صورة ٢٢: مرض تقرح جذع الأفوكادو

- ظهور مساحة سوداء دائرية على الثمار المريضة
- تمتد العفن إلى داخل الثمرة مما يتسبب في تلف اللب.

علاج حروق الشمس

تصاب أغصان أشجار الأفوكادو بحروق الشمس عندما يحصل سقوط سريع للأوراق الناجم عن تعفن الجذور أو في بعض حالات التقليل الجائر أو الخاطئ. يتم الوقاية أو العلاج عبر طلاء الأفرع المكشوفة بمزيج من الكلس أو سلفات النحاس. في حال التقليل الجائر يتم وضع برنامج تسميد فعال لضمان النمو السريع.



صورة ٢٣: عوارض تعفن فاكهة الأفوكادو



صورة رقم ٢٤: حروق الشمس الناتجة عن تساقط سريع لأوراق الأفوكادو الناجم عن تعفن الجذور أو التقليل

٣. ١. ٢ مرض الأنثراكنوز Anthracnose

مرض ناتج عن الإصابة بفطر *Collectotrichum gloeosporioides*، يصيب الأوراق والثمار معاً.

عوارض المرض

- تظهر على الورق بقع كبيرة بنية داكنة اللون، قد تتشكل أبواغ (Spore) زهرية اللون على هذه البقع في الظروف الرطبة.

- تنتقل هذا الأبواغ بواسطة الرطوبة من الأوراق إلى الثمار.

- ينتج عن هذه الأبواغ بقع عفن على جلد الثمرة من الخارج تدخل في مرحلة سبات.

- يظهر هذا المرض أيضاً بعد القطاف عندما تبدأ صلابة الثمار في الانخفاض. فيعود ليخترق العفن إلى الداخل.

- هذه البقع الصغيرة والدائرية التي كانت موجودة في البداية على جلد الثمرة يتغير لونها إلى الغامق وتصبح

غائرة مع مرور الوقت.

- كلما طالت الفترة بين قطاف وإستهلاك الثمرة كلما تتطور المرض ويظهر على شكل بقع دائرية سوداء مغطاة

بكتل وردية اللون.

يفضل تسويق الأصناف المعرضة لهذا المرض بسرعة، خاصة الباكورية ذات الجلد الناعمة لكي لا

يتحول لون اللب إلى بني وطعمه إلى نكهة متزنخة.



صورة ٢٥: مرض الأنتراكناوز على أوراق وثمار الأفوكادو

الوقاية والمكافحة

- تقليم الأغصان والفروع اليابسة ونقلها إلى خارج الحقل لحرقها قبل أن تتكاثر الفطريات.
- النقل والتوضيب الحذر لتقليل تعرض الثمار للكدمات.
- التبريد السريع للوصول إلى درجة الحرارة المثلى للصفى والمحافظة عليها أثناء التسويق.
- تتضمن طرق التحكم بهذا المرض المكافحة بالمبيدات الفطرية خلال مرحلة ما قبل القطاف باستخدام سلفات النحاس (٣٤,٥ ٪)، ٦٠٠ س س للبرميل ٢٠٠ لتر ماء.

٣. ١. ٣ مرض جرب ثمرة الأفوكادو

هو مرض ناتج عن الفطر *Sphaceloma perseae*، يصيب الأوراق وثمار الفوكادو. هناك أصناف أكثر قابلية للجرب مثل اللولا، الأتندر والفويرتي والريد أما أصناف البينكرتون، الهاس واللامب هاس فهي مقاومة للمرض.

عوارض المرض

- ظهور بقع بنية اللون، خشنة اللمس، فلينية وغير منتظمة في الشكل على سطح الثمرة.
- يقتصر جرب الأفوكادو على السطح الخارجى للثمرة ولا تغزو اللب ولكن يتشوه شكل الثمار.
- الثمار المصابة بالجرب هي أكثر عرضة لمرض الأنتراكناوز.




صورة ٢٦: عوارض مرض الجرب على ثمار الأفوكادو

الوقاية والعلاج

- تقليم الأغصان والفروع اليابسة من شجرة ونقلها إلى خارج الحقل لحرقها قبل أن تتكاثر الفطريات.
- تتضمن طرق التحكم بهذا المرض المكافحة بالمبيدات الفطرية خلال مرحلة ما قبل القطاف باستخدام سلفات النحاس (٣٤,٥ ٪)، ٦٠٠ س س للبرميل ٢٠٠ لتر ماء.

أضرار ناتجة عن إحتكاك الأوراق أو الأغصان بسطح الفاكهة
قد تصاب الثمار بخدوش بالجلد تظهر على شكل عوارض الإصابة بمرض جرب الأفوكادو. السبب هو إحتكاك الأوراق أو الأغصان بالثمار. من أجل الوقاية من ظهور هذه العوارض يتم العمل على التخفيف من شدة الرياح عبر زرع مصدات للرياح.

صورة ٢٧: أضرار ناتجة عن إحتكاك الأوراق أو الأغصان بسطح الفاكهة



٣. ٢ الأكاروز


هو من الآفات الرئيسية في لبنان والذي يصيب أوراق الافوكادو. يتغذى ويتكاثر الأكاروز على الجهة السفلى لورقة الأفوكادو مكونا بيوت من الحرير. يتكاثر الأكاروز على أصناف الهاس، البينكرتون والريد أما أصناف الباكيون، الفويرتي، الامب هاس، والزوتانو فهي مقاومة للإصابة. يموت الأكاروز في فصل الشتاء عندما يبرد الطقس وتتدنى درجات الحرارة، ثم يظهر في شهر آذار ويبدأ بالتزايد تدريجيا في الربيع معتمدا على النموّات الجديدة حتى تبلغ ذروة الإصابة في شهري تموز وأب. يبطأ نمو الأكاروز عندما ترتفع درجة الحرارة إلى ٣٨ درجة مئوية أو أكثر لعدة أيام متتالية.

عوارض الإصابة

- ظهور بقع ذات لون مختلف على الجهة السفلى للورقة.
- تساقط الأوراق
- إصابة الفروع والثمار المكشوفة بأضرار حروق الشمس.

الوقاية والعلاج

- تقليم جيد للأشجار.
- المكافحة باستخدام مبيد الأباتكتين (١,٥ لتر للهكتار أو ٢٠٠ س س للبرميل ٢٠٠ لتر ماء) (فترة التحريم ١٤ يوم).



صورة ٢٨: عوارض الإصابة بالأكاروز على أوراق الافوكادو

٣. ٣ الآفات الحشرية

٣. ٣. ١ الفراشة البيضاء والشحيرة

الإصابة بالفراشة البيضاء

تمتص الفراشة البيضاء غذائها اي عصارة الشجرة من أوراق الأفوكادو (لا تنقل أي مرض)

فيروسية) وتفرز مادة عسلية على سطح الأوراق. تعمل هذه المادة على جمع الغبار كما تساعد على نمو الفطريات التي تسمى بالشحيرة.

الإصابة بالشحيرة

في حال كانت الإصابة شديدة تغطي الشحيرة بشكل كبير أوراق الأفوكادو حتى يصبح لونها اسود مما يؤدي إلى تقليل عملية التمثيل الضوئي، وإحتمال تساقط الأوراق الذي يؤدي بالتالي إلى حروق الشمس للفروع المكشوفة والثمار.

الوقاية والعلاج

١. تقليل جيد.
٢. لا ينصح برش أي مبيد حشري للقضاء على الفراشة البيضاء على الأفوكادو لأنه في كثير من الأحيان ليس فعال.
٣. رش سماد نترات البوتاس ١ كيلو للبرميل للتخفيف من الشحيرة.



صورة ٢٩: الفراشة البيضاء والشحيرة السوداء على أوراق الأفوكادو

٣. ٤ الأمراض الفيروسية

٣. ٤. ١ مرض تبقع الشمس الفيروسي المعدي Sunblotch Viroid Disease

يظهر على جميع أعضاء شجرة الأفوكادو من أوراق وأغصان وجذع وثمار ويؤدي الى ضعف في نمو الشجرة.

عوارض المرض

- على الأوراق: تظهر على الأوراق المريضة بقع بيضاء وصفراء.
- على الجذع: تظهر على الجذع خطوط صفراء.
- على الثمار: تظهر على الثمار بقع بيضاء وصفراء وحمراء. تتشوه الثمار وتفقد قيمتها التجارية.
- على نمو الشجرة: تقزم الأشجار المريضة فتكون قصيرة و بالكاد تنمو.



صورة ٣٠: عوارض مرض تبقع الشمس الفيروسي المعدي على الأوراق و الأغصان



صورة ٣١: عوارض مرض تبقع الشمس الفيروسي المعدي على الثمر

- الوقاية والعلاج
- لا يوجد علاج سوى قلع الأشجار المريضة ونقلها إلى خارج الحقل ومن ثم حرقها.
 - منع استخدام أجزاء من الأشجار المصابة لإنتاج الشتول كاستعمال بذور الثمار لإنتاج أصل بري أو أخذ أجزاء للتطعيم.




صورة ٣٢: عوارض مرض تبقع الشمس الفيروسي المعدي على شجرة الأفوكادو

٣. ٥ الاضطرابات الفيزيولوجية

٣. ٥. ١ توقف نمو الثمار (شكل الخيار) Cocktails or Cukes

حالة سببها فزيولوجي تؤدي الى توقف نمو ثمار الأفوكادو وعدم وجود بذرة بداخلها وتأخذ شكل ثمار الخيار الصغيرة. صنف الفويرتي والأتنجر أكثر عرضة لهذه الحالة. عدة أسباب قد تؤدي الى ظهور هذه الحالة:



- فشل في التلقيح فينتج عن ذلك ثمرة بدون بذرة بطول ١٠ سم مع عرض ٢ إلى ٣ سم.
- درجات حرارة أقل من ١٠ درجات مئوية في الليل وأقل من ١٧ درجة مئوية في النهار لأكثر من ٣ أيام متتالية أثناء فترة التلقيح.
- نقص في عنصر البورون (تسميد كاف من البورون يمكن أن يساعد).

صورة ٣٣: عوارض توقف نمو الثمار (اضطرابات فزيولوجية)

الفصل الرابع: روزنامة العمليات الزراعية السليمة

روزنامة العمليات الزراعية





الفصل الرابع: رزمة العمليات الزراعية السليمة

[illegible]



This publication has been produced with the support of the European Union.
The contents of this publication are the sole responsibility of the ARDP and
can in no way be taken to reflect the views of the European Union.

